

# Aescin żel 40 g ZEL 40 G



Cena: 21,58 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	(0,02g+0,05g+50j.m.)
Opakowanie	40 g
Postać	żel
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Substancja czynna	Escinum, Diethylamini sal., Heparinum na

## Opis produktu

### Aescin żel 40g

1 g żelu zawiera  
alfa-escyna 20 mg,  
salicylan dwuetyloaminy 50 mg,  
heparyna 50 j.m

Aescin żel to lek o działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żyłne. Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przepięcie chłonki. Stosowany jest również wspomagająco w zmniejszaniu innych niekorzystnych objawów, takich jak: bóle i ciężkość nóg, świąd skóry, obrzęki kończyn dolnych i skurcze mięśni łydek, występujące w zaburzeniach krążenia żylnego kończyn dolnych.

### Wskazania:

Lek Aescin stosuje się miejscowo, w leczeniu wspomagającym: urazów takich jak stłuczenia i skręcenia, miejscowych stanów zapalnych z obrzękiem lub bez obrzęku, zapalenia żył kończyn dolnych, krwiaków i obrzęków po zabiegach chirurgicznych oraz po urazach, bólów kręgosłupa z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych.

### Stosowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Aescin żel przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę.

Lek należy stosować średnio 3 do 5 razy na dobę przez rozprowadzenie go cienką warstwą, a następnie wcieranie go w chore miejsce i jego okolice.

Masaż poprzedzający stosowanie żelu przyspiesza wchłanianie substancji czynnej.

### Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Aescinu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

