

Diclofenacum Fastum żel 0,01g/gx50,0

Cena: 14,14 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/g
Opakowanie	50 g (tuba)
Postać	żel
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Substancja czynna	Diclofenacum natricum

Opis produktu

Diclofenacum Fastum żel 0,01g/g - 50 g

Diclofenacum Fastum jest lekiem w postaci żelu do stosowania miejscowego. Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy w ilości 10 mg/g. Diklofenak jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o silnym działaniu.

- 1 przeciwbólowym
- 2 przeciwzapalnym
- 3 przeciwobrzękowym

Wskazania do stosowania

Młodzież powyżej 14 lat, do krótkotrwałego stosowania w:

- miejscowym, objawowym leczeniu bólu w ostrych nadwyrężeniach, skręceniach albo stłuczeniach wywołanych tępymi urazami.

Dorośli, miejscowe, objawowe leczenie bólu oraz innych objawów stanu zapalnego w:

- urazach ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, np. z powodu skręcenia, nadwyrężenia i stłuczenia,
- ograniczonych postaciach stanów zapalnych tkanek miękkich,
- w łagodnej postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Skład jakościowy i ilościowy:

1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy.

JAK DZIAŁA?

- Podstawowy mechanizm działania diklofenaku, substancji czynnej zawartej w żelu Diclofenacum Fastum, polega na hamowaniu działania cyklooksygenazy (COX) – enzymu odpowiedzialnego m.in. za odczuwanie bólu i powstawanie stanu zapalnego.
- W zapaleniach pochodzenia urazowego lub reumatycznego produkt Diclofenacum Fastum łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i skraca czas powrotu do stanu normalnego funkcjonowania.
- Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże Diclofenacum Fastum wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

Stosowanie powyżej 14 roku życia:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej lek ten należy stosować w następujący sposób:

nałożyć lek na skórę, rozprowadzić w miejscu bólu i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia, ilość żelu zależy od rozmiarów bolącego miejsca, najczęściej jest to 2 g do 4 g, co odpowiada paskowi żelu o długości 4 cm do 8 cm. Jest to ilość wystarczająca do pokrycia około 400 do 800 cm² powierzchni skóry, lek należy stosować od 3 do 4 razy na dobę, w razie przypadkowego spożycia należy skontaktować się z lekarzem, po zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.