

DOPPELHERZ AKTIV MAMA KAPS. MAMA 60 KAP



Cena: 41,33 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 60 kaps. |
| Postać | kaps. |
| Producent | QUEISSER PHARMA GMBH & CO. |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Preparat witaminowy przeznaczony dla kobiet planujących ciążę, ciężarnych i karmiących. Zawarte w nim składniki wspomagają rozwój siatkówki oka i mózgu płodu oraz niemowląt; wpływają na prawidłowy rozwój łożyska i płodu; wspomagają wytwarzanie hemoglobiny oraz prawidłową budowę kości i zębów.

Preparat wzmacnia układ nerwowy przyszłej mamy oraz zapobiega zmęczeniu, Poprawia wygląd skóry, a także pozytywnie wpływa na samopoczucie.

Skład:
węglan wapnia (Ca), żelatyna, olej rybi (min. 32% DHA), olej sojowy częściowo uwodorniony, tlenek magnezu (Mg), L-askorbinian wapnia (witamina C), substancje utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol, fumaran żelaza (Fe II), emulgator: lecytyna sojowa, stabilizator: wosk pszczeli żółty, DL-alfa-tokoferol (witamina E), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, amid kwasu nikotynowego (witamina B3), tlenek cynku (Zn), D-pantotenian wapnia (prowitamina B5), beta-karoten, cyjanokobalamina (witamina B12), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), monoazotan tiaminy (witamina B1), ryboflawina (witamina B2), kwas foliowy (witamina B9), cholekalcyferol (witamina D3), jodek potasu (J), D-biotyna (witamina B7).

2 kapsułki zawierają: kwas tłuszczowy DHA 200mg, kwas tłuszczowy EPA 44mg, kwas foliowy 600µg (300%)*, biotyna 60µg (120%)*, witamina B1 1,2mg (109%)*, witamina B2 1,5 mg (107%)*, niacyna (witamina B3) 15mg NE (94%)*, witamina B5 6mg (100%)*, witamina B6 1,9mg (136%)*, witamina B12 3,5µg (140%)*, beta-karoten (ekw. witamina A) 334µg RE (42%)*, witamina C 110mg (138%)*, witamina D3 5µg (100%)*, witamina E 13mg alfa-TE (108%)*, żelazo 15mg (107%)*, jod 100µg (67%)*, wapń 200mg (25%)*, magnez 90mg (24%)*, cynk 10mg (100%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Zalecane spożycie:

2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

Zaleca się stosowanie od miesiąca przed planowaną ciążą do zakończenia karmienia piersią.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce i na opakowaniu.