

DOPPELHERZ AKTIV MOCNE KOSCI CALCIUM 150 T



Cena: 24,76 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Suplement diety uzupełniający niedobory wapnia i witaminy D3, które wzmacniają strukturę kości oraz pobudzają tworzenie tkanki kostnej.

U kobiet jak i mężczyzn po 40. dochodzi zwykle do powolnego zmniejszania się masy kostnej. Udowodniono, że szybkość i stopień zmniejszania się gęstości kości zależy w ogromnym stopniu od diety.

Zwiększone zapotrzebowanie na wapń występuje również u młodzieży, osób aktywnych fizycznie, palących papierosy, pijących kawę, colę lub znaczne ilości herbaty.

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym tkanki kostnej i odpowiada za utrzymanie prawidłowej gęstości i wytrzymałości kości na przestrzeni całego życia człowieka.

Witamina D3 wspomaga wchłanianie wapnia w jelitach i stymuluje powstawanie komórek kościotwórczych.

Witaminy K i C odgrywają rolę w procesach równowagi wapniowej w organizmie.

Skład:

Węglan wapnia (Ca), skrobia ryżowa, subst. zagęszczająca: celuloza mikrokrystaliczna, subst. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, stabilizator: hydroksypropylometyloceluloza, subst. przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, subst. zagęszczająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy, barwnik: dwutlenek tytanu, subst. glazurująca: kwas stearynowy (kwas tłuszczowy), cholekalcyferol (wit. D3), filochinon (wit.K)

Zawartość w 1 tabletkce:

Wapń - 600 mg (75% ZDS*)

Witamina D3 - 5 µg (100% ZDS*)

Witamina K - 40 µg (53% ZDS*)

ZDS*- zalecane dzienne spożycie

Dawkowanie:

Zażywać 1 tabletkę dziennie w trakcie posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletkę można dzielić.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Skonsultować się z lekarzem przy niewydolności nerek, kamicy nerkowej lub nadczynności przytarczyc. W przypadku stosowania leków nasercowych lub antybiotyków należy sprawdzić ulotkę stosowanego leku lub poradzić się farmaceuty. Nie zaleca się stosowania u dzieci do 6 roku życia z uwagi na ryzyko zadławienia.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.