

KIDOFEN 0.1g 100ml ZAWIE 2% = 0,1 G 100 ML



Cena: 10,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/5ml
Opakowanie	100 ml (butelka)
Postać	zaw.doust.
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Lek Kidofen jest wskazany przy:

Gorączce różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych lub odczynu poszczepiennego);

Bólu różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych, bolesne ząbkowanie, bóle głowy, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego).

Skład:

Ibuprofen (Ibuprofenum) - 100 mg/5 ml

Dawkowanie:

Niemowlęta od 3 do 6 miesięcy (5-7,6 kg): 3 razy po 2,5 ml w ciągu doby

Niemowlęta od 6 do 12 miesięcy (7,7-9 kg): 3 do 4 razy po 2,5 ml w ciągu doby

Dzieci od 1 do 3 lat (10-15 kg): 3 razy po 5 ml w ciągu doby

Dzieci od 4 do 6 lat (16-20 kg): 3 razy po 7,5 ml w ciągu doby

Dzieci od 7 do 9 lat (21-29 kg): 3 razy po 10 ml w ciągu doby

Dzieci od 10 do 12 lat (30-40 kg): 3 razy po 15 ml w ciągu doby .

Przeciwwskazania:

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergicznego nieżyty nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ (patrz punkt 4.4); z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (patrz punkt 4.4); przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych - patrz punkt 4.5); w III trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6); ze skazą krwotoczną.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.