

Labiotix zawiesina doustna 5ml D

Cena: 29,76 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 ml
Postać	zaw.doust.
Producent	AXXON SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Labiotix zawiera bakterie probiotyczne kwasu mlekowego (*Lactobacillus rhamnosus* GG).

Lactobacillus rhamnosus GG przyczyniają się do unormowania składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego; ograniczają namnażanie się chorobotwórczych drobnoustrojów; zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji.

Zaleca się stosowanie preparatu u młodzieży, dzieci i niemowląt po 1 miesiącu życia. Stosować w czasie kuracji antybiotykowej oraz po jej zakończeniu; w biegunkach różnego pochodzenia (także tych o ostrym przebiegu) i przy zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego związanych z nieprawidłowym składem flory bakteryjnej.

Skład:

Olek kukurydziany, liofilizowany szczep bakterii (*Lactobacillus rhamnosus* LGG) substancja wypełniająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym.

(10 kropli) preparatu zawiera:

wartość energetyczna 14kj/4kcal,

tłuszcz $<1\text{g}$ w tym: kwas tłuszczowe nasycone $<0,2\text{g}$, kwasy tłuszczowe jednonienasycone $<0,2\text{g}$, kwasy tłuszczowe wielonienasycone $<0,2\text{g}$;

węglowodany $0,1\text{g}$ w tym: cukry $<0,5$,

błonnik $<0,5\text{g}$,

białko 1g ,

sól $<0,02\text{g}$.

Dawkowanie:

Przed spożyciem dokładnie wstrząsnąć butelką.

biegunka o różnej etiologii (w tym ostre biegunki): stosować 5 kropli 2 razy dziennie przez 5-7 dni lub indywidualnie według wskazań lekarza.

zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego: stosować 5 kropli 2 razy dziennie profilaktycznie przez 3-5 dni przed podróżą lub indywidualnie według wskazań lekarza.

antybiotykoterapia: stosować 5 kropli 2 razy dziennie podczas antybiotykoterapii oraz przez 2-3 tygodnie po jej zakończeniu lub indywidualnie według wskazań lekarza.

Preparat można wymieszać z chłodną wodą, mlekiem lub jogurtem. Dzieciom po ukończeniu 1 miesiąca życia odmierzoną porcję preparatu można podawać bezpośrednio doustnie lub wymieszać z półpłynnym pokarmem albo z płynnym o temperaturze nie wyższej niż 37 stopni Celsjusza.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje składowe preparatu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.