

## Laximed Saszetki - dla niemowląt i dzieci



Cena: 21,46 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 sasz.
Postać	-
Producent	SEQUOIA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Laximed** to naturalny, bezpieczny i skuteczny preparat przeznaczony do codziennego stosowania w zaparciu już u niemowląt i małych dzieci a także u osób dorosłych. W skład preparatu wchodzi między innymi dobroczynne, żywe kultury bakterii *Lactobacillus rhamnosus* Lcr35.

Zawarte w nim substancje odpowiadają za działanie wspomagające proces trawienia.

**Laximed** jest wyjątkowo bezpieczny. Może być stosowany przez tak wrażliwe grupy konsumentów jak niemowlęta, dzieci i kobiety w ciąży.

Stosowanie preparatu **Laximed** pomaga przywrócić właściwą perystaltykę jelit znacząco zwiększając częstość wypróżnień, przywraca naturalną florę jelitową, zwiększając ilość tzw. "dobrych" bakterii, a zmniejszając ilość niekorzystnych dla organizmu bakterii.

#### Skład:

Skrobia ziemniaczana, laktoza, sproszkowane mleko, *Lactobacillus rhamnosus* Lcr35.

#### 100g produktu zawiera:

wartość energetyczna: 1619kJ/381kcal,  
tłuszcz 0,6g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,6g,  
węglowodany 87,4g, w tym cukry 37,9g,  
skrobia 50,6g;  
błonnik 0,8g,  
białko 7,4g,  
sól 0,25g,  
*Lactobacillus rhamnosus* Lcr35 200x10<sup>9</sup>CFU\*.

#### 1 saszetka zawiera:

wartość energetyczna: 16,19kJ/3,81kcal,

tłuszcz 0g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0g,  
węglowodany 0,9g, w tym cukry 0,4g,  
skrobia 0,5g;  
błonnik 0g,  
białko 0,1g,  
sól 0g,  
Lactobacillus rhamnosus Lcr35 2x10<sup>9</sup>CFU\*.

\*CFU - jednostki tworzące kolonie

**Dawkowanie:**

1 saszetka dziennie. Efektów stosowania można oczekiwać po 2-3 tygodniach. Należy stosować do czasu pełnego przywrócenia regularności wypróżnienia regularności wypróżnień i/lub ustąpienia czynnościowych bólów brzucha.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w niewielkiej ilości (ok. 2-3 łyżki) letniej wody lub dodać do niewielkiej ilości spożywanego pokarmu: mleka, kaszki, itp.

Należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Preparat należy mieszać wyłącznie z płynami/pokarmami o temperaturze pokojowej.

Preparat należy przyjmować w trakcie lub po śniadaniu.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.