

LoGGic +, krople doustne, 7 ml

Cena: 22,71 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	7 ml
Postać	krop.doustne
Producent	PHARMABEST SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

LoGGic+® krople doustne 7 ml

Zastosowanie

LoGGic+ jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kropli doustnych (zawiesiny).

Produkt zawiera wyselekcjonowane bakterie probiotyczne *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103). Liofilizat bakterii został opracowany w innowacyjnej i opatentowanej technologii MICROBAC, zwiększającej wytrzymałość bakterii na procesy technologiczne i środowisko zewnętrzne, dzięki czemu produktu nie trzeba przechowywać w lodówce, a efektywność kolonizacji w jelitach w porównaniu do preparatów opracowanych w klasycznej technologii jest wyższa.

Składniki

Olej MCT (Medium Chain Triglycerides – trójglicerydy średniołańcuchowe) liofilizowane żywe kultury bakterii kwasu mlekowego MICROBAC zawierające *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103) 5% (wytworzone z udziałem pochodnych mleka), cholekalcyferol (witamina D), DL-alfa-tokoferol (witamina E).

Zalecana dzienna porcja do spożycia

10-20 kropli zawiesiny.

Sposób przygotowania i sposób użycia

Produkt gotowy do spożycia. Wstrząsnąć przed użyciem. Krople można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub po rozpuszczeniu w letnim płynie.

Przed pierwszym użyciem należy odkręcić zakrętkę i zastąpić ją kroplomierzem dołączonym do opakowania. Przed każdym użyciem, produkt należy wstrząsnąć kilkukrotnie i odmierzyć zalecaną ilość kropli za pomocą kroplomierza. Po zastosowaniu produkt należy szczelnie zamknąć.

Ważne informacje

Produkt zalecany do stosowania od pierwszych dni życia u noworodków, niemowląt i małych dzieci. Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Produkt bezglutenowy, bez laktozy.

Równoległe stosowanie u niemowląt lub przez matki karmiące piersią, innych preparatów z witaminą D wymaga konsultacji medycznej.