

Milifen zaw.doust. 0,1g/5ml 100ml(butelka)



Cena: 6,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/5ml
Opakowanie	100 ml (butelka)
Postać	zaw.doust.
Producent	PINEWOOD LABORATORIES LTD
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Milifen jest to preparat zawierający ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu gorączki oraz bólu o słabym lub umiarkowanym nasileniu u dzieci 3.miesiąca życia–12. roku życia o masie ciała większej niż 5 kg.

Skład:

Substancją czynną leku jest ibuprofen.

Każde 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 100 mg ibuprofenu.

Ponadto lek zawiera glicerol, gumę ksantan, maltitol ciekły (E965), polisorbat 80, sacharynę sodową (E954), kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu parahydroksybenzoesan sodowy, wodę oczyszczoną i aromat truskawkowy (zawiera glikol propylenowy).

Dawkowanie:

Doustnie;

Pojedyncza dawka powinna być podawana co około 6-8 godzin; zazwyczaj stosowana dobową dawką leku wynosi 20-30mg/kg masy ciała; nie należy przekraczać zalecanej dawki. Dawkowanie zgodnie ze schematem:

dzieci w wieku 3-6. miesiąca życia (powyżej 5kg): 2,5ml 3 razy na dobę;

dzieci w wieku 6-12. miesięcy (8-10kg): 2,5ml 3 razy na dobę;

dzieci w wieku 1-3. lata (10-15kg): 5ml 3 razy na dobę;

dzieci w wieku 4-6. lat (15-20kg): 7,5ml 3 razy na dobę;

dzieci w wieku 7-9. lat (20-30kg): 10ml 3 razy na dobę;

dzieci w wieku 10-12. lat (30-40kg): 15ml 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania:

Uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku; w przypadku wystąpienia u dziecka napadu astmy, kataru, reakcji skórnych (np. zaczerwienienie, wysypka) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innego leku przeciwbólowego z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych; choroba wrzodowa żołądka, perforacje lub krwawienie; poważne problemy z nerkami, sercem lub wątrobą; silne odwodnienie; krwawienie z naczyń mózgowych lub jakiegokolwiek inne czynne (niekontrolowane) krwawienie; zaburzenia krwi; III trymestr ciąży; dzieci w wieku poniżej 3. miesiąca życia (poniżej 5kg).

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.