

Nurofen Express Forte (Nurofen Caps) kaps.



Cena: 13,38 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,4 g
Opakowanie	10 kaps.
Postać	kaps.miękkie
Producent	RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Nurofen Express Forte zawiera ibuprofen i należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku powyżej 12 lat) w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, (np. bólu głowy, bólu zęba, bólu miesiączkowego) oraz gorączki i bólu związanego z przeziębieniem.

Skład:

Każda kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu

Ponadto lek zawiera: Makrogol 600, Potasu wodorotlenek, Woda oczyszczona, Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, Woda oczyszczona, Czerwień koszenilowa (E124)

Tusz: Opacode WB White NS-78-18011 O składzie: Tytanu dwutlenek (E171), Glikol propylenowy Hypromeloza 3 cP

Dawkowanie:

Dorośli oraz dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej): Dawka początkowa: 1 kapsułka (400 mg Ibuprofenu), popijając wodą; w razie potrzeby przyjmować 1 kapsułkę (400 mg ibuprofenu) co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12lat lub o masie ciała poniżej 40kg.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie przyjmować leku Nurofen Express Forte:

w przypadku nadwrażliwości na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub którykolwiek ze składników leku

jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ),

jeśli pacjent ma (lub miał dwa lub więcej epizody) owrzodzenie żołądka I (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie

jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne),

jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,

jeśli u pacjenta występuje skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,

jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży

jeśli pacjent jest poważnie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego przyjmowania płynów

jeśli u pacjenta występuje krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.