

Poldanen tabl.powl. 0,046 g 30 tabl.

Cena: 40,63 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,046 g
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Substancja czynna	Pygei afr.cort.extr.(Betasitosterolum)

Opis produktu

Poldanen to tabletki wskazane do stosowania przy zaburzeniach oddawania moczu występujących we wczesnym stadium przerostu gruczołu krokowego

Poldanen ułatwia oddawanie moczu, zmniejsza częstość oddawania moczu, a także zmniejsza objętość moczu zalegającego u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego (prostaty). Za działanie leku odpowiada zawarty w wyciągu z kory śliwy afrykańskiej - b-sitosterol. Korzystny wpływ na zaburzenia oddawania moczu tłumaczony jest regenerującym działaniem na komórki nabłonka gruczołu krokowego i gruczołów okołocewkowych i korzystnym wpływie na metabolizm tkanek gruczołu. Jednak dokładny sposób działania Poldanenu nie został w pełni wyjaśniony. Lek nie hamuje przerostu gruczołu krokowego, lecz zmniejsza jedynie związane z nim dolegliwości.

Skład:

1 tabl. zawiera 46 mg wyciągu z kory śliwy afrykańskiej.

Dawkowanie:

Należy przyjmować 2 razy dziennie po 2 tabletki, w czasie posiłku. Tabletki przyjmuje się doustnie popijając wodą. Lek należy stosować regularnie przez minimum 4 tygodnie. w razie potrzeby kurację można powtórzyć. W czasie leczenia, zaleca się wykonywanie regularnych badań urologicznych.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Leku nie należy stosować u pacjentów z rozpoznaniem nowotworem gruczołu krokowego.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.

