

# Sambucol Extra Strong Syrop dla dorosłych



Cena: 33,86 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	120 ml
Postać	-
Producent	SEQUOIA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Sambucol Extra Strong** syrop dla dorosłych, zawiera Antivirin- aktywny składnik wyizolowany z owoców czarnego bzu, który wspomaga organizm w stanach zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej.

Preparat jest wskazany do postępowania dietetycznego w stanach przedgrypowych, grypy i przeziębienia w celu wspomaganie naturalnych funkcji układu immunologicznego. Podawanie preparatu zaleca się również w celu wzmocnienia organizmu w okresach zwiększonego ryzyka infekcji.

Sambucol zawiera standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu ma korzystny wpływ na organizm w stanach zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej. Wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, wspomagając naturalne funkcje układu odpornościowego.

Witaminy C, D, B6, cynk, beta-karoten, kwas foliowy, miedź i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego Sambucol wspomagając organizm skraca grypę nawet o 4 dni.

Sambucol to produkt naturalny o skuteczności potwierdzonej w badaniach.

### Skład:

syrop glukozowy, woda oczyszczona, ekstrakt z owoców czarnego bzu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), cholekalcyferol (witamina D), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), beta-karoten, glukonian cynku, kwas foliowy, siarczan miedzi, selenian sodu, aromat malinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu.

### 10ml zawiera:

węglowodany 7,3g w tym: cukry 7,3g;  
ekstrakt z owoców czarnego bzu 3,8g;  
witamina C 150mg (188%)\*;  
cynk 15mg (150%)\*;  
witamina D 10mcg (200%)\*;  
witamina B6 1,4mg (100%)\*;  
beta-karoten (ekwiwalent witaminy A) 0,5mg (83mcg) (10%)\*;  
kwas foliowy 200mcg (100%)\*;  
miedź 1mg (100%)\*;  
selen 100mcg (182%).

\*ZDS- Zalecane Dienne Spożycie.

**Dawkowanie:**

W stanach grypy i przeziębienia: 10 ml (dwie łyżeczki) cztery razy dziennie;  
w celu wzmocnienia organizmu w okresach zwiększonego ryzyka infekcji: 10 ml (dwie łyżeczki) dziennie.

Syrop należy spożyć bezpośrednio doustnie. Nie należy popijać i mieszać preparatu z innymi płynami.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.  
Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny przyjmować preparatu bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.