

# Scorbolamid draż. 20 szt. DRAŻ. 20 TAB



Cena: 14,26 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	0,3g+0,005g+0,1g
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.drażow.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Substancja czynna	Salicylamidum, Rutosidum, Acidum ascorb.

## Opis produktu

Scorbolamid (100mg + 5mg + 300mg) x 20 tabl. draż.

### Wskazania:

Ból i gorączka związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle.

### Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na salicylamid lub inne składniki leku;  
nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;  
astma z polipami nosa (wywołana lub zaostrzona przez kwas acetylosalicylowy);  
czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego;  
zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka);  
zaburzenia krzepności krwi (np. hemofilia, trombocytopenia);  
genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy po długotrwałym, doustnym przyjmowaniu kwasu askorbowego);  
kamica nerkowa w wywiadzie (ryzyko powstawania kamieni moczowych po zastosowaniu dużych dawek kwasu askorbowego);  
hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna, nadmierna ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu;  
ciąża;  
karmienie piersią.

Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat, poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a.

### Skład i postać:

Salicylamidum + Rutosidum + Acidum ascorbicum (300mg + 5mg +100mg), tabletki drażowane.

Salicylamid - Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie.

Kwas askorbowy - Uzupelnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w czasie infekcji.

Rutozyd - Wzmacnia naczynia krwionośne i zwiększa ich elastyczność. Ponadto chroni witaminę C przed utlenieniem i dlatego witamina C dłużej działa.

**Dawkowanie i sposób podawania:**

dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: Doustnie, zwykle 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy na dobę.

preparat najlepiej przyjmować w czasie posiłku albo popić szklanką wody lub mleka.

należy stosować najmniejsze skuteczne dawki.

leczenie objawowe bez porady lekarskiej należy prowadzić najkrócej jak to możliwe

Dostępne opakowanie zawiera 20 tabletek drażowanych