

Stoperan kaps.twarde 2 mg 18 kaps.

Cena: 17,38 PLN



Opis słownikowy

Dawka	2 mg
Opakowanie	18 kaps.
Postać	kaps.twarde
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Loperamidum

Opis produktu

Stoperan kapsułki

Stoperan zawiera loperamid. Jest to lek przeciwbiegunkowy. Stoperan hamuje nasilone ruchy jelit, a także zwiększa wchłanianie wody. Wskutek tego spowalnia przechodzenie treści pokarmowej przez jelita, zmniejsza częstość i liczbę wypróżnień oraz powoduje zwrotne wchłanianie wody w jelicie grubym, zmienia konsystencję stolca.

Skład:

1 kapsułka zawiera:

substancję czynną: loperamidu chlorowodorek 2mg;

substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian.

Stosowanie;

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Biegunka ostra:

pierwsza dawka 2 kapsułki (4mg), a następnie 1 kapsułka (2mg) po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 8 kapsułek (16mg) na dobę.

Biegunka przewlekła:

początkowo 1 kapsułka (2mg) 2 razy na dobę, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 4 - 6 kapsułek (8 - 12mg) na dobę.

U dzieci dawkę leku należy dostosować do masy ciała (3 kapsułki na 20kg masy ciała)

Dzieci w wieku od 9 do 12 lat:

Biegunka ostra:

1 kapsułka (2mg) po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6mg) na dobę.

Biegunka przewlekła:

1 kapsułka (2mg) po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 8 lat:

Biegunka ostra:

1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.

Biegunka przewlekła:

1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 2 kapsułki (4 mg) na dobę.

Przeciwwskazania:

- jeśli występuje uczulenie na loperamid lub którykolwiek ze składników leku
- w stanach, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit
- w niedrożności jelit, ostrym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego
- w bakteryjnym zapaleniu jelita cienkiego i okrężnicy
- w ostrej czerwonce
- dzieci w wieku poniżej 6 lat

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.