

Tantum Rosa rozt.dopochw. 1mg/ml 5but.a140



Cena: 30,48 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Opakowanie	5 but.a 140ml
Postać	rozt.dopochw.
Producent	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

TANTUM ROSA - roztwór dopochwowy

Pięć jednorazowych butelek po 140 ml
Szybka aplikacja leku
Higiena stosowania
Komfort podania
Różany zapach

Przygotowanie leku:

Aby przygotować butelkę do użycia należy odkręcić zabezpieczający kapturek, który okrywa biały aplikator. Następnie należy wyciągnąć końcówkę aplikatora do oporu lub do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Tylko całkowite wyciągnięcie aplikatora pozwala na odblokowanie zaworu i przeprowadzenie płukania.

Stosowanie:

Ostrożnie wprowadzić aplikator do pochwy, i powoli naciskać ściany butelki, aż do całkowitego jej opróżnienia.

Jeżeli jest to możliwe płukanie należy wykonać:

w pozycji leżącej – najlepiej w wannie
w pozycji stojącej – pod prysznicem
można również wykonać płukanie w pozycji siedzącej – na bidecie lub sedesie

Dla bezpieczeństwa i wygody zaleca się wykonanie płukania pochwy w bezpiecznej i stabilnej pozycji, z ewentualnym wykorzystaniem wkładki antypoślizgowej.

Po wykonaniu płukania należy pozostać w pozycji leżącej przez kilka minut, w celu zatrzymania przez ten czas roztworu w pochwie.

Dawkowanie:

Dawka dobową produktu leczniczego wynosi od 1 do 2 płukań.

Leczenie dolegliwości i objawów zapalenia sromu i pochwy oraz szyjki macicy, a także profilaktyka przed i pooperacyjna w ginekologii: płukać pochwę roztworem od 1 do 2 razy na dobę w zależności od nasilenia objawów.

Lekarz może zalecić inne dawkowanie.

Samodzielne leczenie ciągle nie powinno przekraczać 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zdecydować lekarz.

Dla osiągnięcia istotnego efektu terapeutycznego zalecane jest stosowanie produktu leczniczego przez minimum 3 dni. Zawarty w butelce roztwór dopochwowy, o temperaturze pokojowej, jest gotowy do zastosowania. Możliwe jest podniesienie jego temperatury, poprzez zanurzenie butelki na kilka minut w ciepłej wodzie.

Skład jakościowy i ilościowy:

100 ml roztworu dopochwowego zawiera 0,1 g benzydaminę chlorowodoru (benzydaminę hydrochloridum) Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek.

Wskazania do stosowania:

Leczenie dolegliwości i objawów (ból, pieczenie, świąd, upławy, zaczerwienienie, obrzęk) w:

przebiegu zapalenia sromu i pochwy
przebiegu zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia
również po chemio- i radioterapii
profilaktyce przed i pooperacyjnej w ginekologii

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą