

TRAUMON ZEL 10% 50 G

Cena: 27,52 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/g
Opakowanie	50 g
Postać	żel
Producent	MYLAN IRE HEALTHCARE LTD
Substancja czynna	Etofenamatum

Opis produktu

Etofenamat- substancja czynna leku **Traumon** działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Etofenamat należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany miejscowo wchłania się przez skórę i gromadzi w zmienionych zapalnie tkankach.

Stosowanie na skórę ogranicza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych typowych dla NLPZ podawanych doustnie. Traumon nie pozostawia na skórze tłustej warstwy

Wskazania do stosowania:

- tępe urazy takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów,
- choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych,
- reumatyzm pozastawowy (ból okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych (zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgniastych, torebek stawowych),
- zapalenie nadkłytki.

Skład:

Substancją czynną leku jest etofenamatu.

Inne składniki leku: karbomer 940, eter makroglu oleinocetylowy, sodu wodorotlenek, alkohol izopropylowy, maktogol 400, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie:

Jeśli lekarz nie zaleci, należy nałożyć pasek długości 5 do 10 cm leku Traumon żel na skórę w okolicy objętej bólem, pokrywając nim powierzchnię nieco większą niż obszar objęty bólem i wcierać aż do całkowitego wchłonięcia się leku.

Powtarzać 3 do 4 razy na dobę. Leczenie dolegliwości reumatycznych trwa zazwyczaj 3 do 4 tygodni, zaś tępych urazów (np. urazów sportowych)- do 2 tygodni.

Przeciwwskazania:

Leku Traumon nie stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku,
- w trzecim trymestrze ciąży,
- u dzieci i młodzieży.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.