

## VISINE CLASSIC KROPL 0,05% 15 ML



Cena: 21,34 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/ml
Opakowanie	15 ml (butelka)
Postać	krop.do oczu
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD
Substancja czynna	Tetryzolini hydrochloridum

## Opis produktu

**VISINE CLASSIC**  
(Tetryzolini hydrochloridum)  
0,5 mg /ml, krople do oczu, roztwór.

**Skład leku Visine Classic:**  
1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodoru tetryzoliny.

**Substancje pomocnicze:**  
Sodu chlorek,  
Kwas borowy,  
Wersenian disodowy,  
Benzalkoniowego chlorku 17% roztwór,  
Sodu boran,  
Woda oczyszczona.

Plastikowa butelka 15 ml zakończona kroplomierzem, w kartonowym pudełku. 1 butelka zawiera 15 ml kropli.

Krople do oczu Visine Classic wskazane są w leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, będących skutkiem podrażnienia, np.przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, soczewki kontaktowe, a także w alergicznych stanach zapalnych takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw. Krople do oczu łagodzą towarzyszące objawy takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie.

**Stosowanie:**Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, wkraplać 1 do 2 kropli do każdego oka 2 do 3 razy na dobę.Działanie leku rozpoczyna się w ciągu kilku minut po zakropleniu i utrzymuje się przez 4 do 8 godzin. Przed zakropleniem należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć dopiero po około 15 minutach od zastosowania preparatu.

Lek może być stosowany nie dłużej niż 5 dni. Stosowanie dłużej niż 5 dni może odbywać się tylko pod nadzorem lekarza.

Dzieci:

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. U dzieci w wieku 2-6 lat stosowanie leku powinno odbywać się pod nadzorem lekarza.

**Sposób podania:**

Odkręcić zakrętkę, buteleczkę lekko ścisnąć i obrócić do góry dnem. Zmniejszając nieco nacisk wpuścić odrobinę powietrza do buteleczki. Dzięki specjalnemu aplikatorowi z bezpieczną, zaokrągloną końcówką, każdy najmniejszy nacisk spowoduje wypłynięcie jednej kropli.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu nie należy dotykać końcówką pojemnika do jakiegokolwiek powierzchni, a po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć.

Po upływie 1 miesiąca od pierwszego otwarcia butelki lek należy wyrzucić, nawet jeśli nie został zużyty.