

VITA BUERLECITHIN DRAZ. 36 TAB



Cena: 21,27 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	36 tabl.
Postać	tabl.drażow.
Producent	TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Lecithinum

Opis produktu

Vita Buerlecithin Tabletki drażowane.

Vita Buerlecithin jest lekiem wzmacniającym dostępnym w postaci płynu doustnego oraz tabletek drażowanych, w skład którego wchodzi lecytyna oraz witaminy.

Lecytyna jest substancją fosfolipidową uzyskiwaną z soi. Stanowi ona bogate źródło choliny, będącej budulcem substancji przekątnikowej acetylocholin, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na czynność układu nerwowego, a także mięśni szkieletowych. Lecytyna bierze udział w przemianie materii, normalizuje stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, zapobiega odkładaniu się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych.

Witaminy z grupy B obecne w leku Vita Buerlecithin uzupełniają dzienne zapotrzebowanie i wspomagają działanie lecytyny. Uczestniczą one w przemianie białek, węglowodanów, tłuszczów oraz regulują czynności układu nerwowego.

Sodowy D-pantotnian wpływa na czynność przewodu pokarmowego i regenerację tkanki nabłonkowej, wzrost włosów i paznokci.

Skutki działania leku Vita Buerlecithin są odczuwalne po kilku dniach stosowania. W celu osiągnięcia właściwego efektu terapeutycznego, zalecane jest stosowanie leku przez dłuższy czas.

Wskazania:

Wskazaniami do stosowania leku Vita Buerlecithin tabletki drażowane są:

- osłabienie pamięci i koncentracji,
- stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność,
- stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się),
- pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym,
- objawy niedoboru witamin z grupy B,
- stan rekonwalescencji po przebytej chorobie.

Ponadto lek Vita Buerlecithin płyn można stosować:

- pomocniczo u osób w podeszłym wieku,
- zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,
- zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

Stosowanie:

Tabletkę drażowaną należy rozgryźć.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Vita Buerlecithin to:

Dzieci w wieku od 12 lat i dorośli:

o ile lekarz nie zaleci inaczej, 3 razy na dobę 1-2 tabletki drażowane.

Przy większym osłabieniu organizmu dawkę dobową można podwoić.

Dzieci

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: do 2 tabletek drażowanych na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vita Buerlecithin

W razie jednorazowego przyjęcia dawki większej niż maksymalna zalecana dawka dobową, (6 tabletek drażowanych), należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Substancje czynne:

lecytyna sojowa, witamina B1, witamina B2, witaminą B6, witamina E, pantotenian wapnia.

Opakowanie:

Blister w tekturowym pudełku zawierający 36 lub 72 tabletki drażowane.

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.