

# Witamilki Probiotyk krople 5ml D

Cena: 28,74 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 ml
Postać	krople
Producent	ZAKŁADY FARM. COLFARM
Substancja czynna	-

## Opis produktu

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci. W profilaktyce wspomagania mikroflory jelitowej oraz w okresie zwiększonego zapotrzebowania na bakterie kwasu mlekowego.

Produkt **Witamilki Probiotyk** w porcji dziennej zawiera 5 x 10<sup>9</sup> JTK bakterii występujących naturalnie w przewodzie pokarmowym człowieka.

Bakterie:

Lactobacillus acidophilus,  
Lactobacillus casei,  
Lactobacillus rhamnosus,  
Bifidobacterium breve,  
Lactobacillus plantarum,  
Bifidobacterium bifidum,  
Bifidobacterium longum,  
Lactobacillus helveticus,  
Lactococcus lactis,  
Streptococcus thermophilus zawarte w produkcie wspomagają naturalną mikroflorę jelitową.

### Skład:

Olej roślinny MTC, liofilizowana mieszanka 10 szczepów bakterii ( Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus helveticus\*, Lactococcus lactis\*, Streptococcus thermophilus\*) (stabilizator): mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych.

\* Bakterie pochodzące z mleka.

### Zawartość w 5 kroplach (0,2ml):

wartość energetyczna 6,6kJ/1,6kcal

tłuszcz 0,19g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,19g,  
węglowodany 0g w tym cukry 0g;  
białko 0g;  
sól 0g;  
liofilizowana mieszanka 10 szczepów bakterii  $5 \times 10^9$  JTK.

**Dawkowanie:**

5 kropli na dobę.

5 kropli zawiera  $5 \times 10^9$  JTK (Jednostki Tworzące Kolonie) bakterii występujących naturalnie w przewodzie pokarmowym człowieka.

Sposób użycia: opakowanie zaopatrzone jest w kroplomierz, który pozwala na odmierzenie właściwej porcji do spożycia. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Krople należy odmierzyć z pomocą kroplomierza. Można stosować bezpośrednio lub dodać krople do niewielkiej ilości letniego płynu (woda, mleko).

Podawać do spożycia bezpośrednio po przygotowaniu, między posiłkami. W przypadku stosowania antybiotykoterapii przygotować i spożyć co najmniej dwie godziny po zażyciu antybiotyku.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.