

## ActiFerol Fe START prosz.dorozp. 30sasz.



Cena: 31,26 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 sasz.
Postać	prosz.do rozp.
Producent	POLSKI LEK
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**ActiFerol Fe®** zawiera żelazo w unikalnej, zmikronizowanej formie. Dzięki mikronizacji, czyli dużemu rozdrobieniu, przyswajalność żelaza jest dwukrotnie wyższa – co potwierdzają badania kliniczne. Wpływa to na skuteczną normalizację poziomu hemoglobiny. **Żelazo ActiFerol Fe®** jest delikatne dla przewodu pokarmowego, uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku, dzięki temu nie odczuwa się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Nie powoduje, często występujących przy suplementacji, skutków ubocznych, takich jak: biegunka, zaparcia, wymioty, nudności. Nie daje metalicznego posmaku. Posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognised As Safe).

Dodatkowo ActiFerol Fe® START zawiera:

Witaminy B6, która pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek. Ponadto bierze udział w transporcie i metabolizmie żelaza.

Witaminy C, która zwiększa przyswajalność żelaza oraz korzystnie wpływa na stan naczyń krwionośnych.

Kwas foliowy, który jest ważnym składnikiem biorącym udział w procesach krwiotworzenia i podziałach komórkowych. Dodatkowo pozwala utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi poprzez poprawę elastyczności żył i tętnic.

Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka

#### Skład:

Pirofosforan żelazowy (żelazo III), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), kwas askorbinowy (witamina C), kwas foliowy, maltodekstryna, dekstroza.

#### 1 saszетка zawiera:

energia 14,31 kJ/ 3,42 kcal,

białko 0g,

węglowodany 0,84g,

cukry 0g,

tłuszcz 0g,

kwasy tłuszczowe nasycone 0g,

błonnik pokarmowy 0g,

sód 0g,  
bioprzyswajalne żelazo 7 mg (49,93% ZDS)  
witamina B6 25 mg (1787,5% ZDS)  
witamina C 20 mg (25% ZDS)  
kwas foliowy 150 mcg (75% ZDS)  
ZDS - Zalecane Dienne Spożycie

**Dawkowanie:**

W stanach niedoboru żelaza i/lub anemii: przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania. Zawartość saszetki należy dodać do niewielkiej ilości (2-3 łyżki) ściągniętego pokarmu matki lub mleka, a następnie wymieszać. Przygotowaną zawiesinę podać dziecku bezpośrednio po sporządzeniu.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.