

Aesciner Retard kaps. oprz. uwal. 0,265g 30k

Cena: 18,16 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,265 g
Opakowanie	30 kaps.
Postać	kaps.o prz.uwal.
Producent	GENEXO SP. Z O.O.
Substancja czynna	Hippocastani seminis extractum siccum

Opis produktu

Aesciner Retard

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde.

Lek zawiera wyciąg z kasztanowca, który uszczelnia ściany naczyń krwionośnych i normalizuje ich przepuszczalność. Zmniejsza kruchość naczyń, przywraca ich elastyczność i odporność na uszkodzenia. Działając przeciwwysiękowo zapobiega tworzeniu się obrzęków. Lek stosowany jest w objawach przewlekłej niewydolności żylniej, takich jak obrzęk kończyn dolnych oraz związanych z tym dolegliwościach: ból i uczucie ciężkości, nocne skurcze łydek, uczucie napięcia żył, świąd.

Stosowanie:

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych leku Aesciner Retard, to 1 kapsułka dwa razy na dobę przed posiłkiem. Kapsułki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu. W przypadku wystąpienia łagodnych objawów żołądkowo-jelitowych, kapsułkę należy przyjmować do posiłku.

Lek może być stosowany długoterminowo.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Aesciner Retard

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

Przerwanie stosowania leku Aesciner Retard

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skład:

Substancja czynna leku jest suchy wyciąg z nasion kasztanowca zwyczajnego Hippocastani semen extr. (5:1). 1 kapsułka zawiera 240-290 mg wyciągu standaryzowanego na zawartość 50 mg glikozydów triterpenoidowych w przeliczeniu na escynę.

Inne składniki leku to: dekstryna, kopoliwidon, żelatyna, talk, pochodne poliakrylowe, trietylu cytrynian, dwutlenek tytanu (E 171), tlenek żelaza (E 172).

Opakowanie:

Kapsułki umieszczone są w blisterach i pakowane w pudełko kartonowe, po 30 lub 60 kapsułek.