

# Anacard protect tabl.dojelit. 0,075g 30tab



Cena: 5,62 PLN

## Opis słownikowy

|                   |   |
|-------------------|---|
| Dawka             | 0,075 g   |
| Opakowanie        | 30 tabl.  |
| Postać            | tabl.dojelit.   |
| Producent         | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Substancja czynna | Acidum acetylsalicylicum                                  |

## Opis produktu

### Anacard protect tabl.dojelit. 0,075g 30tabl.

Lek przeciwzkrzepowy - pochodna kwasu salicylowego.

#### WSKAZANIA:

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) oraz wszystkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi:

#### DAWKOWANIE:

##### Dorośli:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, 1 tabletkę (75 mg) raz na dobę.

W świeżym zawałe serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 300 mg (4 tabletki) - tabletki dojelitowe należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie. W świeżym zawałe serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu.

**Dzieci:** Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci w wieku do 12 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.

#### Skład:

1 tabletkę zawiera: substancję czynną: kwas acetylosalicylowy – 75mg oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia żelowa kukurydziana, talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, trietylu cytrynian, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan.