


CALPEROS 500 KAPS. 0,5 G = 0,30 KAP



Cena: 17,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,2 g Ca ²⁺
Opakowanie	30 kaps. (2 x15)
Postać	kaps.twarde
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Substancja czynna	Calcium carbonicum

Opis produktu

Calperos 500 zawiera wapń w postaci węgla wapnia.

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym niezbędnym do uzyskania równowagi elektrolitycznej organizmu i prawidłowego funkcjonowania wielu mechanizmów regulujących.

Produkt wskazany przy:

- diecie ubogiej w wapń,
- zaburzeniach wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych,
- zmniejszonym stężeniu wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo - mięśniowej,
- stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji)

Calperos 500 zalecany jest uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy oraz wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych.

Skład:

Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera 500 mg węgla wapnia, co odpowiada 200 mg jonów wapnia oraz substancje pomocnicze: magnezu stearynian, talk, dwutlenek tytanu (E 171), indygotyna (E 132), żelatyna.

Dawkowanie:

Zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie:

Dorośli - 1 do 2 kapsułek (od 200 do 400 mg wapnia zjonizowanego) 2 do 3 razy dziennie;

Dzieci powyżej 7 roku życia i młodzież – 1 kapsułka (200 mg wapnia zjonizowanego) do 3 razy dziennie.

Nie należy zażywać więcej niż 1200 mg jonów wapnia na dobę czyli nie więcej niż 6 kapsułek Calperos 500.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, zwiększone stężenie wapnia we krwi, kamica nerkowa. W przypadkach

niewydolności nerek, odwodnienia, zaburzeń stężenia elektrolitów we krwi, chorób serca, sarkoidozy (choroba układowa zajmująca węzły chłonne wnek płucnych i płuc) oraz podczas leczenia glikozydami nasercowymi lub tiazydowymi środkami moczopędnymi przez zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza. Podobnie należy postąpić przed zastosowaniem leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.