

# Chlorivag Kadefarm glob.dopochw. 10glob.a2

Cena: 33,00 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 glob.a 2g
Postać	glob.dopochw.
Producent	KADEFARM SP.Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### CHLORIVAG®

kwasy hialuronowy, bromelaina, dichlorowodorek chlorheksydyny, witamina E

Globulki dopochwowe, 10 sztuk.

#### Działanie przeciwzapalne:

- Wspomaga produkcję śluzu i utrzymuje prawidłowe nawilżenie błon śluzowych.
- Przyspiesza gojenie i regenerację mikrourazów nabłonka pochwy.
- Zapobiega nawracającym infekcjom bakteryjnym błon śluzowych.
- Utrzymuje prawidłowe środowisko pochwy.

Działa przeciwzapalnie i zapobiega infekcjom, przyspiesza gojenie uszkodzeń nabłonka.

Chlorivag® zalecany jest do długotrwałego stosowania profilaktycznego u pacjentek po leczeniu przeciwzapalnym, ze skłonnością do częstych infekcji (spowodowanych także przez aktywność sportową, pływanie w basenie, częste kąpiele w wannie), w okresie menopauzy i przyjmujących antykoncepcję hormonalną.

Chlorivag® działa zapobiegawczo i leczniczo w chorobach o charakterze zapalnym, infekcyjnym oraz z nieprawidłowymi zmianami w nabłonku pochwy. Przeciwdziała nawrotom stanów zapalnych śluzówki pochwy. Stabilizuje wydzielanie śluzu, wspomagając tym samym odbudowę i utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej pochwy.

Rekomendowany w przypadku zaczerwienienia, świądu, pieczenia i podrażnienia, spowodowanych różnymi typami chorób dróg rodnych o podłożu bakteryjnym i grzybiczym. Stosowany jako terapia wspomagająca przed i po ginekologicznych zabiegach chirurgicznych.

**Wskazania do stosowania:**

- uzupełnienie terapii przeciwzapalnej pochwy i sromu,
- profilaktyka przeciw nawrotom chorób śluzówki pochwy o charakterze zapalnym, dystroficznym i infekcyjnym,
- terapia wspomagająca w odbudowie prawidłowego nawilżenia śluzówki pochwy,
- silne działanie łagodzące w przypadku świądu, zaczerwienienia, podrażnienia, spowodowanych różnymi typami chorób w okolicy pochwy i sromu,
- terapia wspomagająca przed i po ginekologicznych zabiegach chirurgicznych.

**Dawkowanie:**

Pacjentki po leczeniu przeciwzapalnym: 2 razy dziennie 1 globulka, przez dwa dni; następnie 1 globulka co drugi dzień, przez około dwa tygodnie.

Pacjentki ze skłonnością do częstych infekcji, w okresie menopauzy, stosujące antykoncepcję hormonalną: dwa razy w tygodniu 1 globulka.

W terapii przewlekłej, powyżej 1,5 miesiąca, utrzymywać dawkowanie dwa lub trzy razy w tygodniu 1 globulkę.