

Clotidal (Clotrimazolum US Pharmacia) krem



Cena: 21,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/g
Opakowanie	1 tub.a 35g
Postać	krem dopochw.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Clotrimazolum

Opis produktu

Clotidal, 10 mg/g, krem dopochwowy 35 g

Clotidal, krem dopochwowy. 1 gram kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.

Wskazania:

Miejscowe leczenie: Grzybiczego zapalenia błon śluzowych narządów płciowych wywołanego przez drożdżaki (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy).

Zakażenie żołądki prącia przez drożdżaki.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Skład:

– Substancją czynną leku jest klotrymazol: 1 g kremu dopochwowego zawiera 10 mg klotrymazolu.

– Pozostałe składniki to: cetylu palmitynian, oktylododekanol, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy, alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona.

Stosowanie:

Lek jest przeznaczony do leczenia dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat.

Jeśli po upływie 3 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej lub jeśli objawy nie znikną po 7 dniach stosowania, należy skontaktować się z lekarzem.

Drożdżycza pochwy:

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować raz na dobę, przed snem, przez 6 kolejnych dni.

Zakażenie żołądki prącia (zwieńczenia prącia) przez drożdżaki (Candida):

Należy nakładać cienką warstwę leku 2 do 3 razy na dobę na miejsce zmienione chorobowo, delikatnie wcierając. Typowy okres kuracji to 1 do 2 tygodni.

Opakowanie:

Tuba i 6 aplikatorów dopochwowych po 5 ml, w tekturowym pudełku.