

Contractubex żel 50g

Cena: 61,54 PLN



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | (0,01g+0,1g+50j.m.)/ |
| Opakowanie | 50 g (tuba) |
| Postać | żel |
| Producent | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH |
| Substancja czynna | Allantoinum, Allii cepae extr., Hepar.na |

Opis produktu

Contractubex lek stosowany w leczeniu blizn różnego pochodzenia.

Żel stymuluje tworzenie prawidłowej tkanki łącznej i przeciwdziała niefizjologicznemu rozrostowi blizny, poprawia nawodnienie i ukrwienie tkanki oraz ją rozluźnia, łagodzi podrażnienia i działa regenerująco, działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo. Wskazany w leczeniu blizn ograniczających ruch, powiększonych (hipertroficznym, obrzmiałym, o kształcie bliznowca) oraz nieestetycznych bliznach pooperacyjnych, po amputacjach, blizn pooparzeniowych i powypadkowych, przykurczacch, np. palców (przykurcz Dupuytren), a także przykurczach ścięgien spowodowanych urazami oraz kurczeniem się blizny.

Skład:

heparyna, ekstrakt płynny z cebuli, alantoinę, kwas sorbinowy, metylu parahydroksybenzoesan, guma ksantan, makrogol, substancja poprawiająca zapach Fragrance 231616, woda oczyszczona

Stosowanie:

Leczenie należy rozpocząć możliwie szybko po zagojeniu rany / zdjęciu szwów, gdy nie będzie już wysięków. Kilka razy na dobę wcierać delikatnie żel w skórę lub tkankę blizny, aż do całkowitego wchłonięcia. W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych można założyć na noc opatrunek z żelem. Leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od wielkości blizny lub występowania przykurczu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować na uszkodzoną skórę, na niewyleczone rany, na blizny obejmujące duże powierzchnie skóry, na błony śluzowe.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.