

DIH TABL. 0,5 G 60 TAB



Cena: 47,38 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---|
| Dawka | 0,5 g |
| Opakowanie | 60 tabl. |
| Postać | tabl.powl. |
| Producent | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Substancja czynna | Diosminum |

Opis produktu

Tabletki powlekane **DIH** zawierają diosminę, związek zaliczany do tzw. bioflawonoidów. **DIH** zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.

Wskazania do stosowania:

Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:

- bóle i nocne kurcze nóg,
- uczucie ciężkości nóg,
- żylaki kończyn dolnych,
- poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajęczki naczyniowe,
- obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg).

Objawowe leczenie żylaków odbytu.

Skład:

Substancją czynną leku jest zmkronizowana diosmina w ilości 500 mg w tablecie

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, otoczka Opadry II Pink.

Dawkowanie:

Podanie doustne.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to dwie tabletki na dobę podczas posiłku, tj. po i tabletkę rano i wieczorem (co odpowiada podaniu dawki dobowej 1000 mg diosminy, w dwóch dawkach podzielonych po 500 mg).

Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się podawanie większych dawek do 6 tabletek na dobę, tj. 2 razy na dobę po 3 tabletki przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni zmniejszenie dawki: 4 tabletki na dobę, tj. 2 razy na dobę po 2 tabletki.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.