

Duozial syrop (2,5mg+58mg Ca 2+)/5 150 ml



Cena: 17,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(2,5mg+58mg Ca 2+)/5
Opakowanie	150 ml
Postać	syrop
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Cetirizini dihydrochloridum, Calcium chlo

Opis produktu

Duozial jest lekiem o działaniu przeciwalergicznym. Lek zawiera dwie substancje czynne: cetyryzyny dichlorowodorek i wapnia chlorek.

Syrop łagodzi objawy dotyczące nosa i oczu, związane z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (tj. kichanie, świąd nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaczerwienienie i swędzenie oczu, łzawienie) oraz łagodzi objawy przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (tj. świąd, pokrzywka, zaczerwienienie skóry).

Skład:

5 ml syropu zawiera:

2,5 mg dichlorowodoru cetyryzyny

58 mg jonów wapnia w postaci wapnia chlorku dwuwodnego

Pozostałe składniki to: sacharoza, potasu sorbinian, aromat waniliowy AR 0345 (diacetyl, etylu maślan, wanilina, glikol 1,2 - propylenowy, woda), sukraloza, woda oczyszczona

Dawkowanie:

Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: 5 ml syropu 2 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 10 ml syropu 2 razy na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 20 ml syropu raz na dobę.

Preparat należy stosować na 60 minut przed jedzeniem, , popijając dużą ilością płynu, aby zapobiec podrażnieniu żołądka. Nie popijać napojami mlecznymi.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się przy podwyższonym stężeniu wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z hiperwitaminozą D, nadczynnością przytarczyc, sarkoidozą, chorobami nowotworowymi dającymi przerzuty do kości, np. plasmocytoma). Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podczas przyjmowania tego leku nie należy pić alkoholu. W czasie ciąży i karmienia piersią przed zażyciem należy skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.