

Efferalgan tabl.mus.500 mg 16 szt. TABL. 0



Cena: 11,12 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Opakowanie	16 tabl.
Postać	tabl.mus.
Producent	BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Paracetamolum

Opis produktu

Efferalgan stosowany jest jako środek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy w bólach różnego pochodzenia (ból głowy, zębów, stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne).

Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po około 30-60 min (tabl.) lub około 20-30 min (tabl. musujące).

Często stosowany z podobnych wskazań jak kwas acetylosalicylowy - u chorych uczulonych na pochodne kwasu salicylowego.

Skład:

1 tabletkę musującą zawiera: substancję czynną: paracetamol 500mg. Pozostałe składniki: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan bezwodny, sorbitol, sodu dokuzynian, powidon, sodu sacharynian, sodu benzoosan.

Dawkowanie:

Doustnie. Tabletki musujące należy przyjmować po rozpuszczeniu tabletki w letniej wodzie.

Dorośli i młodzież powyżej 15 r.ż. 1-2 tabl. jednorazowo lub 2-3 razy dziennie; w bólach przewlekłych i nowotworowych 500-750 mg co 4 h.

Dzieci: 7-13 r.ż. - 1/2 tabl. 1-3 razy dziennie,

Dzieci 13-15 r.ż. 1 tabl. - 1-3 razy dziennie.

Nie należy przekraczać dawki 4 g na dobę; nie przyjmować częściej niż co 4 h. Nie stosować dłużej niż 3 dni (u dzieci) lub 7 dni (dorośli) bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min) odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić co najmniej 8 godzin.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników leku, nie stosować u dzieci o masie ciała mniejszej niż 13kg, ciąża, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, alkoholizm, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, stosowanie inhibitorów MAO, odwodnienie, laktacja.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.