

ENCOPIRIN 325mg tabl.dojel.100 szt. TABL.



Cena: 19,32 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Dawka | 0,325 g |
| Opakowanie | 100 tabl. |
| Postać | tabl.dojelit. |
| Producent | MEDICOFARMA S.A. |
| Substancja czynna | Acidum acetylsalicylicum |

Opis produktu

Encopirin, 325 mg, tabletki dojelitowe
Acidum acetylsalicylicum**Co to jest lek Encopirin i w jakim celu się go stosuje**

Kwas acetylosalicylowy zawarty w leku Encopirin działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Wskazania do stosowania

Najważniejsze zastosowanie leku Encopirin to:

- przeziębienie, grypa, stany gorączkowe;
 - leczenie przewlekłe bólu i stanów zapalnych na przykład w reumatoidalnym zapaleniu stawów, młodzieńczym zapaleniu stawów, toczniu rumieniowatym układowym, chorobie zwyrodnieniowej stawów, zespole Reitera (zapalenie spojówek, zmiany śluzówkowoskórne, zapalenie stawów) i w zmianach okołostawowych;
 - łagodne i słabo nasilone bóle zębów, głowy, bóle menstruacyjne;
- w profilaktyce:
- hamowanie agregacji płytek krwi u chorych ze świeżym zawałem serca z niestabilną chorobą wieńcową;
 - w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;
 - w zapobieganiu występowania napadów przejściowego niedokrwienia i udarów mózgu;
 - po wszczepieniu pomostów arterialno-wieńcowych;
 - w zapobieganiu zakrzepicy żyłnej i zatorowi płuc.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Encopirin:Kiedy nie stosować leku Encopirin:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- w przypadku chorób, w których występują lub mogą wystąpić krwawienia, takie jak:
 - skaza krwotoczna;
 - choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;
- w czasie ciąży (w ostatnim trymestrze ciąży);

- u dzieci poniżej 12 lat (leku Encopirin nie wolno stosować u dzieci);
- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i nerek;
- u pacjentów z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
- u dzieci do 12 lat w gorączkowych chorobach wirusowych (szczególnie grypa i ospa wietrzna) ze względu na zagrożenie wystąpieniem zespołu Reye'a, rzadkiej ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu;
- jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Ostrzeżenia:

Nie stosować co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym ze względu na możliwość nasilenia krwawień. Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci i młodzież:

Leku Encopirin nie należy podawać dzieciom do lat 12.

Jak przechowywać lek Encopirin:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje:**Co zawiera lek Encopirin:**

- Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy 325 mg.
- Pozostałe substancje pomocnicze to: skrobia preżelowana, celuloza mikrokrystaliczna, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).

otoczka Opadry: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna.

otoczka ACRYL-EZE: kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan; trietylu cytrynian.

Jak wygląda lek Encopirin i co zawiera opakowanie:

Produkt leczniczy Encopirin pakowany jest w polietylenowe pojemniki z polietylenowym wieczkiem zawierającym środek pochłaniający wilgoć, w tekturowym pudełku.

1 pojemnik zawiera 30 lub 100 szt. tabletek dojelitowych.