

## FLoractin kaps.żel. 0,29 g 20 kaps.



Cena: 18,01 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	0,29 g
Opakowanie	20 kaps.
Postać	kaps.żel.
Producent	NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Substancja czynna	Lactobacillus rhamnosus, inulina

## Opis produktu

**FLORACTIN** to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od pierwszych dni życia (również wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową), dzieci i dorosłych.

**FLORACTIN** zawiera żywe kultury bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103) o korzystnym dla zdrowia działaniu potwierdzonym w badaniach klinicznych.

**FLORACTIN** stosuje się w celu:

- zmniejszenia ryzyka powikłań występujących podczas antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu
- skrócenia czasu trwania biegunki
- wspomagania odporności
- zachowania równowagi mikroflory jelitowej

**Skład:**

*Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC 53103, maltodekstryna, otoczka - hydroksypropylometyloceluloza, stabilizator - mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych esttryfikowane kwasem cytrynowym, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja przeciwutleniająca - palmitynian askorbylu.

**Dawkowanie:**

Niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 12 lat - 1 kapsułka dziennie podczas posiłku.  
Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli - 2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

W przypadku niemowląt i małych dzieci należy otworzyć kapsułkę, po czym dodać jej zawartość do spożywanego pokarmu. Dzieci starsze i dorośli – kapsułkę można połknąć i popić wodą

Nie należy mieszać zawartości kapsułki ze zbyt zimnymi lub gorącymi posiłkami.

W przypadku antybiotykoterapii można przyjmować w tym samym czasie jak antybiotyki

**Przeciwwskazania i środki ostrożności:**

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

- Zaleca się, aby produkt był przyjmowany pod nadzorem lekarza.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Nie należy przekraczać porcji preparatu zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
- Nie stosować w przypadku braku wskazań lekarskich.
- Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Chronić przed światłem i wilgocią.

Przed zastosowaniem preparatu zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.