

Fluimucil

Muko, 200mg/1g, gran.d/s.r.dou(i.rów)PhVit,Aus, 20sasz



Cena: 13,42 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,2 g
Opakowanie	20 sasz.a 1g
Postać	gran.do sp.roztw.doust.
Producent	PHARMAVITAE SP. Z O.O.SP.K.
Substancja czynna	Acetylcysteinum

Opis produktu

Fluimucil Muko, 200mg/1g, gran.d/s.r.dou(i.rów)PhVit,Aus, 20sasz

Fluimucil® Muko to lek w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego.

Głównym składnikiem leczniczym jest acetylocysteina – łatwo przenikająca przez błony komórkowe substancja czynna, która upłynnia oraz zmniejsza lepkość śluzu i wydzieliny śluzowo-ropnej, dzięki czemu ułatwia ich odkrztuszenie.

Lek ma charakterystyczny żółty kolor i pomarańczowy smak.

Substancja czynna podana w postaci roztworu bardzo dobrze się wchłania.

Dawkowanie:

Dzieci w wieku od 7 do 14 lat – 1 saszетка 2 x na dobę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat – 1 saszетка 2-3 x na dobę.

Fluimucil Muko, 200 mg, granulatu do sporządzania roztworu doustnego. 1 saszетка (1 g granulatu) zawiera substancję czynną: 200 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 g granulatu zawiera 25 mg aspartamu i 662,7 mg sorbitolu.

Postać farmaceutyczna: granulatu do sporządzania roztworu doustnego. Żółty granulatu o pomarańczowym zapachu oraz możliwym zapachu siarki, który jest typowy dla zawartej w produkcie substancji czynnej.

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy Fluimucil Muko stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej

odkrztuszanie u pacjentów z objawami infekcji w obrębie górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, stan astmatyczny, fenyloketonuria, stosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 lat – gdyż substancja czynna: acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat.