

Gerdin Max tabl.dojelit. 0,02 g 14 tabl.

Cena: 10,81 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,02 g
Opakowanie	14 tabl.
Postać	tabl.dojelit.
Producent	S-LAB SP. Z O. O.
Substancja czynna	Pantoprazolum

Opis produktu

Gerdin Max, 20 mg

Kapsułki dojelitowe, 14 kapsułek dojelitowych.

Składniki:

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Wskazania:

Gerdin Max jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.

Dawkowanie i sposób podawania:

Dawkowanie:

Zalecana dawka leku to 20 mg pantoprazolu (1 tabletki) raz na dobę.

W celu uzyskania złagodzenia objawów konieczne może okazać się stosowanie leku przez kolejne 2-3 dni. Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane.

Bez konsultacji z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Jeśli objawy nie ustąpią ciągu 2 tygodni leczenia pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Szczególne grupy pacjentów:

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie ma

konieczności modyfikacji dawkowania.

Młodzież i dzieci w wieku poniżej 18 lat:

Produkt Gerdin Max nie jest zalecany u dzieci poniżej 18 lat, ze względu na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Sposób podawania:

Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać, należy je przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Jednoczesne podawanie z atazanawirem.

Sposób przechowywania:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.