

Hevipoint 50mg/g sztyft na skórę 3g



Cena: 20,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,05 g/g
Opakowanie	1 szt.
Postać	sztyft
Producent	ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.
Substancja czynna	Aciclovirum

Opis produktu

HEVIPOINT 50mg/g – sztyft na skórę 3g

WSKAZANIA:

Lek Hevipoint w postaci sztyftu zawiera substancję czynną acyklowir o działaniu przeciwwirusowym, wykazującym silne działanie na wirusy opryszczki zwykłej (Herpes simplex). Hevipoint jest stosowany w leczeniu zakażenia warg wirusem opryszczki zwykłej (nawracającej opryszczki wargowej) u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

DAWKOWANIE:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

HEVIPOINT należy stosować 5 razy na dobę w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną.

HEVIPOINT należy stosować na powstałe zmiany chorobowe lub miejsca, gdzie tworzy się opryszczka natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów opryszczki, jak np.: pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie, lub niezwłocznie po ich wystąpieniu. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki.

CZAS KURACJI:

Leczenie powinno trwać przynajmniej 4 dni. Jeśli objawy opryszczki nie ustępują, leczenie może być kontynuowane maksymalnie do 10 dni. W przypadku, gdy zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach, pacjent powinien zwrócić się do lekarza.