

# IBUM O SMAKU BANANOWYM ZAWIE 2%=0,1G 130 G



Cena: 25,09 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/5ml
Opakowanie	130 g (but.)
Postać	zaw.doust.
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Substancja czynna	Ibuprofenum

## Opis produktu

**Ibum, zawiesina dla niemowląt od 3 miesiąca życia**, zawiera ibuprofen działający przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Leczenie słabego i umiarkowanego bólu takiego jak: ból głowy, ból gardła, ból zębów, ból po ekstrakcji zębów, ból na skutek ząbkowania, ból stawów, ból mięśni, ból pooperacyjny.

Leczenie stanów gorączkowych różnego pochodzenia ( m.in. przeziębienia, grypy).

### Skład:

5ml zawiesiny zawiera: substancje czynne: 100mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze.

### Dawkowanie:

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. Do opakowania dołączona jest miarka.

Dawka dobową produktu Ibum, zawiesina doustna, jest ściśle uzależniona od masy ciała i wynosi 20-30mg/kg m.c., w dawkach podzielonych, zgodnie z poniższym schematem:

dzieci w wieku 3-6. miesięcy (5-7,6kg): 2,5ml (50mg) maksymalnie 3 razy na dobę;

dzieci w wieku 6-12. miesięcy (7,7-9kg): 2,5ml maksymalnie 3-4 razy na dobę;

dzieci w wieku 1-3. lat (10-15kg): 5ml maksymalnie 3 razy na dobę;

dzieci w wieku 4-6. lat (16-20kg): 7,5ml maksymalnie 3 razy na dobę;

dzieci w wieku 7-9. lat (21-29kg): 10ml maksymalnie 3 razy na dobę;

dzieci w wieku 10-12 lat (30-40kg): 15ml maksymalnie 3 razy na dobę;

dzieci powyżej 40kg: 15-20ml maksymalnie 3-4 razy po 15ml na dobę.

Preparatu nie podawać niemowlętom o masie ciała poniżej 7 kg.

### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nie stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości, jakiegokolwiek objawy alergii w postaci zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy; choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy; perforacja

lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ; ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek; ciężka niewydolność serca; nie stosować ibuprofenu jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2; III trymestr ciąży; naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie; zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia); skaza krwotoczna; zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.