

Innofer baby zawiesina 50ml D



Cena: 48,52 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 ml
Postać	zaw.
Producent	SMART PHARMA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Innofer baby zawiesina 50 ml

Innofer baby®

jest zawiesiną doustną zawierającą żelazo elementarne i jest wskazany do postępowania dietetycznego w celu zapobiegania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii)

Innofer baby – produkt przeznaczony dla dzieci i niemowląt, zawierający żelazo elementarne w postaci zawiesiny doustnej, które jest dobrze wchłaniane, a jednocześnie łagodne dla żołądka. Jego niezwykła skuteczność pomoże Ci w zapobieganiu wystąpienia anemii i niedoboru żelaza u Twojego dziecka.

Odpowiednia dawka żelaza bez skutków ubocznych

Ze względu na groźne skutki zarówno niedoboru, jak i nadmiaru żelaza, specjaliści rekomendują precyzyjne dawki żelaza dostosowane do masy ciała dziecka. Z tego względu Innofer baby posiada dozownik, który pozwoli Ci na podawanie dziecku odpowiedniej dawki żelaza. Przyjmowanie prawidłowej ilości żelaza jest niezwykle istotne, ponieważ ludzki organizm nie posiada mechanizmu usuwania tego pierwiastka. Niewchłonięty nadmiar żelaza może podrażniać żołądek, sprzyjać rozwijaniu się niekorzystnych bakterii w jelitach oraz uszkadzać komórki.

Innofer baby®:

1. przeznaczony jest dla noworodków (również urodzonych przedwcześnie i z niską masą urodzeniową), niemowląt i dzieci
2. przeznaczony jest do stosowania pod nadzorem
3. nie zawiera białek mleka krowiego, laktozy, glutenu i może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników
4. nie zawiera substancji konserwujących, aromatów, barwników i substancji słodzących
5. posiada neutralny smak i zapach
6. nie barwi zębów

7. nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu
8. nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia
9. nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego
10. może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli spożywany jest przez osoby, u których nie stwierdzono wskazań lekarskich do jego podawania

Sposób użycia

Przed spożyciem, w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny, produkt należy dokładnie wymieszać.

W tym celu należy energicznie wstrząsać butelką nie krócej niż 30 sekund. Po prawidłowym wymieszaniu zawiesina przybiera ciemną barwę.

Nasylenie barwy zawiesiny może się różnić w zależności od partii produktu (od jasnoszarej aż do grafitowej lub czarnej).

Badania trwałości zawiesiny wykazały, że po zalecanym czasie mieszania zawiesina jest jednorodna (gotowa do podania) przez co najmniej 3 minuty. Jeżeli w czasie 3 minut od momentu zakończenia mieszania nie zostanie pobrana odpowiednia dawka, produkt należy ponownie dokładnie wymieszać.

Zaleca się wstrząsnąć intensywnie butelką przed każdorazowym pobraniem dawki, nawet jeżeli podawanie odbywa się w ciągu 3 minut od uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Odmierzoną dawkę należy podać zaraz po przygotowaniu bezpośrednio do jamy ustnej.

W przypadku niemowląt karmionych wyłącznie mlekiem zaleca się podanie produktu ok. 15 minut przed podaniem mleka lub 2 godziny po.

Po podaniu odmierzonej dawki strzykawkę ze względów higienicznych należy umyć letnią bieżącą wodą bez detergentu.

Składniki:

olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), żelazo elementarne.