

Ircolon Gastro tabl. 0,1 g 10 tabl.



Cena: 17,24 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|----------------|
| Dawka | 0,1 g |
| Opakowanie | 10 tabl. |
| Postać | tabl. |
| Producent | POLFARMEX S.A. |
| Substancja czynna | Trimebutinum |

Opis produktu

Ircolon Gastro 100 mg x 10 tabletki

Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe:

zaburzeń trawienia objawiających się uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i bólami brzucha;
zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego wywołanych stresem (biegunka, zaparcia, ból brzucha).

Produkt Ircolon Gastro przeznaczony jest do leczenia krótkotrwałego.

Okres stosowania produktu bez konsultacji z lekarzem nie powinien przekraczać 3 dni. Jeśli objawy nie ustąpiły po 3 dniach lub pacjent czuje się gorzej należy porozumieć się z lekarzem.

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

100 mg maleinianu trimebutyny (1 tabletki) 2 lub 3 razy na dobę, przed posiłkiem.

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat

O zastosowaniu leku Ircolon Gastro w tej grupie wiekowej powinien zdecydować lekarz.

Maleinian trimebutyny można stosować u dzieci w dawce nie wyższej niż 6 mg/kg masy ciała na dobę.

Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Wykaz substancji pomocniczych;

Laktoza jednowodna
Hypromeloza 6 cP
Kroscarmeloza sodowa

Kwas cytrynowy jednowodny
Magnezu stearynian
Krzemionka koloidalna, bezwodna