


Kolaktaza, krople, 10 ml



Cena: 29,47 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 10 ml |
| Postać | krople |
| Producent | SOLPHARM SP. Z O.O. |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Kolaktaza ma postać dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego w formie kropli doustnych. Wykazuje właściwości odpowiadające za neutralizowanie doraźnych zaburzeń trawiennych, łagodzi dolegliwości związane z częstym występowaniem kolki u niemowląt.

Aktywnym składnikiem Kolaktazy jest enzym laktaza występujący naturalnie w organizmie człowieka. Niedobór laktazy może skutkować przejściowymi dolegliwościami trawiennymi spowodowanymi nietolerancją laktozy zawartej w pokarmie. Laktaza to grupa enzymów, odpowiadających za rozkład laktozy (cukier mleczny znajdujący się w mleku matki lub mleku modyfikowanym) na cukry proste (glukozę i galaktozę) łatwiejsze do przyswojenia przez organizm.

Kolaktaza może być bezpiecznie stosowana od dnia narodzin. Kolaktaza powinna być używana tak długo, aż dziecko wyrośnie z niedoboru laktazy, a organizm dziecka zacznie wytwarzać wystarczającą jej ilość wraz z rozwojem jelit - zwykle około 3.-4. miesiąca życia.

Skład:

Gliceryna, woda, laktaza.

Wartości odżywcze produktu (100 g):

Białko-4,15g-8%

Węglowodany- 51,6g - 50%

Wartość energetyczna produktu (100 g): 923kJ (223,04 kcal)

Aktywność enzymu laktaza:

225 FCC/kropla

Dawkowanie:

Kolaktaza może być stosowana zarówno podczas karmienia piersią, jak i mlekiem modyfikowanym.

Karmienie piersią

Do wysterylizowanego, plastikowego pojemnika wlej kilka łyżeczek mleka z piersi. Dodaj 4 krople Kolaktazy. Podaj tak przygotowane mleko dziecku za pomocą łyżeczki i kontynuuj karmienie piersią jak zwykle.

Mleko modyfikowane

Przygotuj mleko zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Dodaj 4 krople Kolaktazy do ciepłego mleka.

Uwaga: nie dodawaj Kolaktazy do gorącego mleka. Wstrząśnij dobrze butelkę i podaj dziecku. Niewykorzystaną mieszankę wyrzuć.

Przygotowywanie mleka do późniejszego wykorzystania

Przygotuj mleko zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Dodaj 2 krople Kolaktazy do ciepłego mleka i wstaw do lodówki na minimum 4 godziny. Mieszanka musi zostać wykorzystana w ciągu 12 godzin od momentu jej przygotowania.

Podgrzej mieszankę do temperatury w jakiej podajesz dziecku mleko. Niewykorzystaną mieszankę wyrzuć.

Gotowa mieszanka

Podgrzej mleko. Dodaj 4 krople Kolaktazy do ciepłego mleka. Uwaga: nie dodawaj Kolaktazy do gorącego mleka. Wstrząśnij dobrze butelkę i podaj dziecku. Niewykorzystaną mieszankę wyrzuć.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.