

Lakcid Forte kaps.twarde 10 kaps.



Cena: 38,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 kaps.
Postać	kaps.twarde
Producent	BIOMED-LUBLIN SP.Z.O.O. WYTW.SUR.I SZCZEP.
Substancja czynna	Lactobacillus rhamnosus

Opis produktu

Lakcid® FORTE kapsułki twarde

Oporny na 27 antybiotyków, w tym najczęściej stosowane

Zawiera min. 10 000 000 000 dobrych bakterii, których nie niszczą najczęściej stosowane antybiotyki.

WSKAZANIA

poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy, zapobieganie biegunce podróżnych, leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.

SPOSÓB PODAWANIA

Sposób podawania

Produkt leczniczy podaje się doustnie.

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając ją przegotowaną i ostudzoną do temperatury pokojowej wodą lub mlekiem.

Zawartość kapsułki (proszek) można rozpuścić w około 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać. Taki sposób podania leku szczególnie zalecany jest dla niemowląt i dzieci.

Dzieci i młodzież

W przypadku podawania leku niemowlętom i dzieciom zawartość kapsułki (proszek) należy rozpuścić w około 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY:

Minimum 10 mld CFU pałeczek *Lactobacillus rhamnosus*:

Szczep <i>Lactobacillus rhamnosus</i> Pen	- 40%
Szczep <i>Lactobacillus rhamnosus</i> E/N	- 40%
Szczep <i>Lactobacillus rhamnosus</i> Oxy	- 20%

CFU – jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit).

Pełny wykaz substancji pomocniczych:

Zawartość kapsułki: Mleko odtłuszczone, Sacharoza, Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki: dwutlenek tytanu (E 171), hydroksypropylometyloceluloza, kompleks miedziowy chlorofilu (E 141), żółcień pomarańczowa (E 110)

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W obowiązującym okresie ważności produkt może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15°C - 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.