

LentoNit K krop.dooczu 10ml(butelkazzakrap



Cena: 22,54 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 ml (butelka z zakrap.)
Postać	krop.do oczu
Producent	PHARM SUPPLY SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Lento Nit@K krople do oczu, 10 ml

Wskazania do stosowania:

Krople do oczu Lento Nit@K stosuje się w celu nawilżania powierzchni oka, a także w profilaktyce zmętnień soczewki i ciała szklanego oka.

Przeciwwskazania:

Lento Nit@K nie może być stosowany w przypadku nadczynności tarczycy oraz nadwrażliwości na jod lub jakiegokolwiek inny składnik preparatu. Stosowanie Lento Nit@K w czasie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne informacje:

Nie jest znany wpływ Lento Nit@K na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Bezpośrednio po zakropieniu oczu może wystąpić krótkotrwałe zaburzenie widzenia.

Nie stosować Lento Nit@K, jeżeli butelka jest uszkodzona.

Nie zakraplać Lento Nit@K jednocześnie z innymi preparatami podawanymi do oka, ponieważ jednoczesne zakraplanie może zmienić działanie tych preparatów. W przypadku stosowania z innymi preparatami do oczu należy zachować odstęp czasowy ok. 30 minut pomiędzy wklepieniem kolejnych preparatów.

Przed podaniem Lento Nit@K należy zdjąć soczewki kontaktowe. Po 15 minutach można je ponownie założyć.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia końcówki zakraplacza należy unikać jej kontaktu z powierzchnią oka lub innymi przedmiotami.

Zaleca się dokładnie umyć ręce przed zastosowaniem preparatu. Aby zakropić preparat należy:

zdejść zakrętkę
lekko odchylić głowę do tyłu
dolną powiekę odciągnąć nieco do dołu i wkropić 1-2 krople preparatu do worka spojówkowego, naciskając na butelkę
butelkę trzymać otworem do dołu (pionowo)
te same czynności powtórzyć na drugim oku
ponownie nałożyć zakrętkę

Interakcje z innymi lekami:

Nie zaobserwowano dotychczas interakcji z innymi lekami. Znacząco zwiększone dawki jodku potasu mogą, w połączeniu z diuretykami oszczędzającymi potas (substancje zwiększające wydalanie moczu), prowadzić do hiperkalemii (podwyższony poziom potasu w osoczu). Należy pamiętać, że informacje te dotyczą również innych niedawno przyjmowanych leków.

Dawkowanie:

1-2 krople Lento Nit@K 3 razy na dobę do worka spojówkowego.

Nieprawidłowe stosowanie:

W przypadku przypadkowego, jednorazowego, zastosowania większej niż zalecana dawki produktu Lento Nit@K działania niepożądane nie powinny wystąpić.

Działania niepożądane:

W przypadku stosowania zgodnego z przeznaczeniem, działania niepożądane nie powinny wystąpić. Jeżeli jednak zaobserwują Państwo u siebie jakiegokolwiek działania niepożądane, należy poinformować o tym swojego lekarza lub farmaceutę i przerwać stosowanie preparatu.

Przechowywanie:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Zawartość butelki może być stosowana nie dłużej niż 4 tygodnie po pierwszym użyciu.

Nie stosować po upływie daty ważności.