

Magne B6 Forte * 100 tabl.



Cena: 47,65 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o

Opis produktu

Magne B6 Forte, 100 mg+10 mg, tabletki powlekane, 100 szt.

Lek z podwójną dawką magnezu na objawy niedoboru magnezu, który nasila objawy stresu. Posiada specjalnie opracowaną recepturę, która zapewnia wszechstronne wsparcie Twojej siły. Łączy magnez z witaminą B6. Zmniejsza nasilenie objawów niedoboru magnezu, w tym uczucia zmęczenia, nerwowość, drażliwość czy wahania nastroju.

Wysoce przyswajalny magnez wzbogacony witaminą B6.

Łagodzenie codziennych objawów stresu wywołanych niedoborem magnezu tj. jak uczucie zmęczenia, nerwowość i wahania nastroju.

Przeznaczony dla osób powyżej 6. roku życia.

Wskazania do stosowania:

Produkt jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu. Na występowanie niedoboru magnezu mogą wskazywać następujące objawy:

- nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, okresowe zmęczenie, senność, łagodne zaburzenia snu
- objawy lęku, w tym skurcze jelit lub kołatanie serca (bez stwierdzonych problemów z sercem)

- skurcze mięśni, mrowienie, drgania powiek

Przyjmowanie magnezu przyczynia się do zmniejszenia tych objawów.

Przykładowe dawkowanie: 2x2 tabletek na dobę*

*Dorośli: 3-4 tabletek w 2 - 3 dawkach podzielonych podczas posiłków. Dzieci i młodzież w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała ok. 20 kg): 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Składniki:

Magnez (w formie cytrynianu magnezu)

Substancja czynna

Magnez, niezbędny minerał występujący we wszystkich tkankach organizmu, bierze udział w funkcjach komórkowych, procesach metabolicznych, przekazywaniu impulsów nerwowych oraz kurczliwości mięśni.

100 mg jonów magnezowych

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)

Substancja czynna

Witamina B6 reguluje procesy metaboliczne, również w układzie nerwowym. Poprawia wchłanianie magnezu i transport komórkowy.

10 mg witaminy B6

Inne składniki

Składniki pomocnicze

laktoza bezwodna, makrogol 6000, magnezu stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek(E 171), talk.

Ostrzeżenia:**Przeciwwskazania:**

nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jednoczesne stosowanie lewodopy. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu. W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od dożylnego podawania magnezu. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Dotyczy tylko chlorowodoru pirydoksyny: Na skutek przyjmowania wysokich dawek pirydoksyny przez długi czas może wystąpić czuciowa neuropatia aksonalna.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych: Laktoza. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.