

Medivag Kadefarm kaps.dopochw. 6 kaps.

Cena: 19,11 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 kaps.
Postać	kaps.dopochw.
Producent	KADEFARM SP.Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

MEDIVAG® kapsułki

Lactobacillus acidophilus, acidum lacticum

Kapsułki dopochwowe 6 sztuk.

W leczeniu dolegliwości intymnych pochwy:

Do stosowania w przypadku świądu, pieczenia, uczucia suchości, podrażnień oraz nadmiernej ilości wydzieliny (upławy), często z nieprzyjemnym zapachem.

W przypadku stwierdzonych infekcji bakteryjnych i grzybiczych.

Odtwarza i stabilizuje prawidłową florę bakteryjną nabłonka pochwy.

Zapobiega nawrotom infekcji.

Normalizuje poziom kwasowości pochwy.

Większość dolegliwości intymnych spowodowana jest zaburzeniem środowiska pochwy. W pochwie w warunkach prawidłowych obecna jest ogromna liczba bakterii, nazywanych mikroflorą lub środowiskiem pochwy. Odpowiadają one za jej kwasowe środowisko (pH). Zmiana poziomu kwasowości, nawet krótkotrwała, może spowodować zaburzenia w obrębie mikroflory pochwy. Jeżeli bakterie kwasu mlekowego zostaną zdominowane przez szkodliwe inne mikroorganizmy (bakterie lub grzyby), mogą wystąpić różne dolegliwości intymne, a w dalszej konsekwencji stan zapalny.

Bakteryjne zapalenie pochwy:

Bakteryjne zapalenie pochwy to stan zaburzenia flory bakteryjnej spowodowany szkodliwymi bakteriami. Można je rozpoznać obserwując zmianę wydzieliny. Wydzielina może być bezbarwna lub zabarwiona, jej ilość może być nadmierna, często o nieprzyjemnym zapachu ryby. Często towarzyszą temu takie dolegliwości jak: świąd, podrażnienie, nadwrażliwość, zaczerwienienie i suchość.

Zakażenia Candida (zakażenia grzybicze):

Kandydoza jest infekcją grzybiczą spowodowaną przez drożdżopodobne grzyby, głównie *Candida albicans*. Zakażenie pochwy przez *Candida* objawia się świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem i zwykle białą wydzieliną.

Mechanizm działania:

kapsułki Medivag® sprzyjają przywróceniu naturalnego stanu fizjologicznego pochwy. Zawierają probiotyczne bakterie kwasu mlekowego *Lactobacillus acidophilus*, normalnie obecne we florze pochwy, a także kombinację składników aktywnych (kwas mlekowy, żurawina), które pozwalają kontrolować stały poziom kwasowości.

Sposób użycia:

Medivag® kapsułki stosuje się przez 6 dni, jeden raz dziennie, przed snem.

Podczas profilaktyki nawracających infekcji, przy nawracających stanach suchości śluzówki pochwy, przy przewlekających dolegliwościach intymnych, Medivag® kapsułki stosuje się co drugi dzień, przed snem, przez 12 dni, a następnie 2 razy w tygodniu, aż do całkowitego ustąpienia dolegliwości.

Stosowanie podczas ciąży i/lub karmienia: należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu.

Medivag® kapsułki dostępny jest w aptekach, bez recepty.