

Multibiotic masc (5mg+0,01g+0,833mg)/ 3 g



Cena: 10,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(5mg+0,01g+0,833mg)/
Opakowanie	3 g
Postać	maść
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY
Substancja czynna	Neomycinum, Bacitracinum, Polymyxini B

Opis produktu

Multibiotic to maść o działaniu bakteriobójczym do stosowania miejscowego zawierająca substancje czynne o różnym, wzajemnie uzupełniającym się mechanizmie działania przeciwbakteryjnego.

Maść wskazana jest do zapobiegania zakażeniom wtórnym drobnych ran ciętych, zadrapań, otarć i oparzeń, pierwotnych i wtórnych bakteryjnych zakażeń skóry (np. zakażone niewielkie rany, zakażenia bakteryjne skóry w oparzeniach i odmrożeniach), wywołane przez bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, paciorkowce) oraz Gram-ujemne pałeczki, w tym bakterie z rodzaju *Pseudomonas*.

Neomycyna hamuje syntezę białek oraz uszkadza błonę cytoplazmatyczną. Mechanizm działania bacytracyny polega na zaburzaniu, hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii.

Polimyksyna B działa bakteriobójczo, a mechanizm działania polega na uszkodzeniu błony cytoplazmatycznej bakterii.

Skład:

siarczan neomycyn, bacytracyna cynkowa, siarczan polimyksyny B, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), wazelina biała

Stosowanie:

Przed każdym nałożeniem maści umyć chore miejsce mydłem i wodą, po czym dokładnie wysuszyć skórę i pokryć cienką warstwą maści. Stosować 2-5 razy w ciągu doby w jednakowych odstępach czasu. Pokryte maścią chore miejsce może być zabezpieczone jałowym ochronnym opatrunkiem gazowym. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować na błony śluzowe, na głębokie kłute rany oraz na ciężkie oparzenia, do oczu, na sączące zmiany chorobowe skóry, u dzieci w wieku poniżej 12 lat, w czasie ciąży i laktacji.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.