

Nasivin 0.025% krople do nosa 10ml. KROPL



Cena: 15,22 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,25 mg/g
Opakowanie	10 ml
Postać	krop.do nosa, roztwór
Producent	MERCK SELBSTMEDICATION GMBH
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu

Nasivin 0,025% Krople do nosa, roztwór.

Oxymetazolini hydrochloridum, produkt leczniczy bez recepty

WSKAZANIA:

Lek Nasivin 0,025% zawiera chlorowodorek oksymetazoliny, który zwęża naczynia krwionośne. Podanie leku Nasivin 0,025% zmniejsza przekrwienie zmienionej zapalnie błony śluzowej i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa powoduje również otwarcie i rozszerzenie przewodów wyprowadzających z zatok przynosowych i oczyszcza trąbkę słuchową. Ułatwia to odprowadzenie wydzieliny i wyleczenie zakażenia bakteryjnego. Lek Nasivin 0,025% jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 1 do 6 lat w następujących przypadkach: ostry nieżyt nosa, naczynioruchowy nieżyt nosa, alergiczny nieżyt nosa, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie trąbki słuchowej, w zapaleniu ucha środkowego, w diagnostyce w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej.

SKŁAD:

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: 0,25 mg chlorowodoru oksymetazoliny
- substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, benzalkoniowego chlorku 50% roztwór, glicerol (85%), cytrynian sodu, woda oczyszczona.

100 ml roztworu zawiera 0,025 g chlorowodoru oksymetazoliny.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE:

Dzieci w wieku od 1 do 6 lat: 1-2 krople leku Nasivin 0,025% należy wkraplać do każdego otworu nosowego 2-3 razy na dobę.

Pojedynczych dawek leku Nasivin 0,025% nie należy stosować częściej niż 3 razy na dobę.

Bez zalecenia lekarza Nasivin 0,025% można stosować jedynie przez krótki okres (3-5 dni, nie dłużej niż 7 dni).

Należy unikać dłuższego stosowania niż zalecane oraz przedawkowania.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Nasivin 0,025% jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.