


Nizoral szampon 60 ml SZAMP 2% 60 ML



Cena: 36,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,02 g/g
Opakowanie	60 ml (butelka)
Postać	szamp.leczn.
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD
Substancja czynna	Ketoconazolum

Opis produktu

Nizoral w postaci szamponu leczniczego jest lekiem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego na skórę. Wskazany do stosowania leczniczo i zapobiegawczo w łupieżu skóry głowy, łojotokowym zapaleniu skóry i łupieżu pstrym.

Substancją czynną preparatu jest ketokonazol, pochodna imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków dermatofitów i drożdżaków. Po zastosowaniu miejscowym ketokonazol szybko łagodzi świąd i zmniejsza nasilenie zmian skórnych.

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu i profilaktyce chorób skóry wywołanych przez drożdżaki, takich jak: łupież owłosionej skóry głowy, łupież ostry wywołany przez Pityriasis versicolor, łojotokowe zapalenie skóry.

Skład:

Substancja czynna: 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu.

Substancje pomocnicze: sól sodowa eteru laurylosulfonowego, sól disodowa eteru monolaurylosulfonobursztynowego, dietylamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, laurdimoniom-zhydrolizowany zwierzęcy kolagen, dioleinian metyloglukozy makroglu 120, kwas solny, chlorek sodu, substancje zapachowe, wodorotlenek sodu imidurea, erytrozyna sodowa (E 127), woda oczyszczona.

Dawkowanie i sposób użycia:

Preparat ma postać szamponu i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Leczenie łupieżu skóry głowy oraz łojotokowego zapalenia skóry: 2 razy na tydzień przez 2–4 tygodni.

Profilaktyka łupieżu skóry głowy oraz łojotokowego zapalenia skóry: 1 raz na tydzień lub 1 raz na 2 tygodnie.

Leczenie łupieżu pstrego: 1 raz na dobę przez 5 dni.

Profilaktyka łupieżu pstrego: przed okresem letnim 1 raz na dobę przez 3 dni.

Niewielką ilość szamponu nanieść i rozprowadzić z niewielką ilością wody na chorobowo zmienionym obszarze skóry. Wytworzyć pianę, pozostawić na skórze przez 3–5 minut, a następnie spłukać.

Przeciwwskazania:

Leku Nizoral szampon leczniczy, 20mg/g nie należy stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na ketokonazol lub którykolwiek składnik leku. Nadwrażliwość na lek objawia się zaczerwienieniem i swędzeniem skóry w miejscu kontaktu szamponu ze skórą.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.