

Nurofen d/dzieci sm.truskaw. zaw.doust.100



Cena: 18,92 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/5ml
Opakowanie	100 ml
Postać	zaw.doust.
Producent	RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Nurofen dla dzieci zawiera ibuprofen (100mg/5ml) działający przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Lek wskazany w przebiegu bolesnego ząbkowania oraz w celu łagodzenia objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie.

Leczenie słabego i umiarkowanego bólu takiego jak: ból głowy, ból gardła, ból zębów, ból po ekstrakcji zębów, ból na skutek ząbkowania, ból stawów, ból mięśni, ból pooperacyjny.

Leczenie stanów gorączkowych różnego pochodzenia (m.in. przeziębienia, grypy).

Skład:

Substancja czynna: 5 ml zawiesiny zawiera 100 mg ibuprofenu.

Dawkowanie:

Doustnie. Doraźnie.

Dawka dobowo: 20-30 mg ibuprofenu/kg m.c. w dawkach podzielonych.

Nurofen zawiesina:

niemowlęta od 3-6 m.ż. (masa ciała 5-7,6 kg): 2,5 ml 3 razy dziennie (150 mg ibuprofenu/dobę);

niemowlęta 6-12 m.ż. (7,7-9 kg): 2,5 ml 3-4 razy dziennie (150-200 mg/dobę);

dzieci od 13 m.ż. - 4 r.ż. (10-15 kg): 5 ml 3 razy dziennie (300 mg/dobę);

dzieci 5-7 r.ż (16-20 kg): 7,5 ml 3 razy dziennie (450 mg/dobę);

dzieci 8-10 r.ż (21-29 kg): 10 ml 3 razy dziennie (600 mg/dobę);

dzieci 11-13 r.ż. (30-40 kg): 15 ml 3 razy dziennie (900 mg/dobę).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu oraz inne NLPZ.

Występująca w przeszłości astma, reakcje skurczowe oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka - po kwasie acetylosalicylowym lub innych NLPZ.

Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. III trymestr ciąży. Ostrożnie stosować u dzieci z niewydolnością nerek, układu krążenia lub zaburzeniami czynności wątroby, z astmą oskrzelową lub nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, przyjmujących leki hipotensyjne, moczopędne, nasercowe i psychotropowe. Ze względu na zawartość maltitolu w zawieszynie należy zachować szczególną ostrożność u osób z dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.