

# Nurofen Express Forte (Nurofen Caps) kaps.

Cena: 21,42 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	0,4 g
Opakowanie	20 kaps.
Postać	kaps.miękkie
Producent	RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.
Substancja czynna	Ibuprofenum

## Opis produktu

**Nurofen Express Forte** zawiera ibuprofen i należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku powyżej 12 lat) w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, (np. bólu głowy, bólu zęba, bólu miesiączkowego) oraz gorączki i bólu związanego z przeziębieniem.

### Skład:

Każda kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.

Ponadto lek zawiera: Makrogol 600, Potasu wodorotlenek, Woda oczyszczona, Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, Woda oczyszczona, Czerwień koszenilowa (E124)

Tusz: Opacode WB White NS-78-18011 O składzie: Tytanu dwutlenek (E171), Glikol propylenowy Hypromeloza 3 cP

### Dawkowanie:

Dorośli oraz dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej): Dawka początkowa: 1 kapsułka (400 mg Ibuprofenu), popijając wodą; w razie potrzeby przyjmować 1 kapsułkę (400 mg ibuprofenu) co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki (1200 mg Ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12lat lub o masie ciała poniżej 40kg.

### Przeciwwskazania:

Kiedy nie przyjmować leku Nurofen Express Forte:

- w przypadku nadwrażliwości na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub którykolwiek ze składników leku
- jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka podczas wcześniejszego stosowania kwasu

acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ),

- jeśli pacjent ma (lub miał dwa lub więcej epizody) owrzodzenie żołądka I (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie,
- jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne),
- jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,
- jeśli u pacjenta występuje skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży
- jeśli pacjent jest poważnie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego przyjmowania płynów),
- jeśli u pacjenta występuje krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie.
- dzieciom w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała poniżej 40 kg.

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.