

- Dedykowany dla pacjentów o zwiększonym zapotrzebowaniu białkowym min. w wyniku udaru niedokrwiennego.
- Do postępowania dietetycznego u pacjentów z odleżynami i innymi trudno gojącymi się ranami.

Przeciwwskazania

- Nie stosować u niemowląt
- Nie stosować u pacjentów z galaktozemią
- Nie stosować u pacjentów wymagających diety bezreszkowej
- Nie zaleca się stosować u pacjentów krytycznie chorych

Sposób użycia

Produkt gotowy do użycia. Podawać przez zgłębnik lub stomię w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego Flocare® w wersji grawitacyjnej lub w wersji do pompy Flocare® 800 lub Flocare® Infinity™.

Dawkowanie

- 1500–2000 ml diety pokrywa dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze

Dodatkowe informacje

- Tylko do stosowania drogą przewodu pokarmowego.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 1-6 lat.

SKŁAD:

Wartość odżywcza		
Wartości odżywcze	100 ml	Jednostka

Wartość odżywcza
Wartości odżywcze

100 ml

Jednostka

Wi
ta
mi
ny

Wartość odżywcza	100 ml	Jednostka
------------------	--------	-----------

Wartości odżywcze		
-------------------	--	--

Sk
ła
dn
iki
mi
ne
ral
ne

Wartość odżywcza
Wartości odżywcze

100 ml

Jednostka

Pi
er
wi
as
tki
śl
ad
o
w
e

Wartość odżywcza
Wartości odżywcze

100 ml

Jednostka

In
ne

Pr
oc
en
t
(%
)e
ne
rgi
i
z: