

Ocusalin 5% UD krop.dooczu 5% 20minims.a0,



Cena: 32,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka	5 %
Opakowanie	20 minims.a 0,5ml
Postać	krop.do oczu
Producent	PHARM SUPPLY SP. Z O.O.
Substancja czynna	Natrium chloratum

Opis produktu

OCUsalin 5% UD

Informacje ogólne:

hipertoniczny roztwór chlorku sodu (5%)
Krople do oczu. Nie zawiera środków konserwujących.

Opis działania:

Ocusalin jest jałowym, hipertonicznym roztworem chlorku sodu (5%), przeznaczonym do stosowania do oka, nie zawierającym substancji konserwujących, w jednodawkowych opakowaniach (minimsach). Ocusalin dzięki swoim właściwościom osmotycznym powoduje resorpcję nadmiaru wody z tkanek rogówki jeśli wystąpił jej obrzęk, przez co następuje poprawa widzenia. Ocusalin stosowany jest zwłaszcza po operacjach oka (na przykład po operacji zaćmy), jak również po zabiegach diagnostycznych (np. po gonioskopii), jeśli wystąpi zaburzenie równowagi osmotycznej w tkankach rogówki.

Sposób użycia:

Oddzielić jeden pojemnik jednodawkowy (minims). Upewnić się, że pojemnik nie jest uszkodzony. Przez pokręcanie górnej, płaską częścią otworzyć pojemnik (nie urywać). Wkraplać 3-5 razy na dobę do worka spojówkowego oka, które wykazuje zmiany. Nie dotykać oka końcówką pojemnika. Po zakropleniu powoli zamknąć oko. Należy ustalić z lekarzem okulistą zarówno częstotliwość zakraplania jak i okres stosowania preparatu!

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie należy stosować tego wyrobu medycznego bez zalecenia lekarza!
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pojemnika nie należy go używać.
Podczas zakraplania nie należy dotykać powierzchni oka pojemnikiem.
Aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia nie należy niczego dotykać otworem pojemnika.
W przypadku obrzęków rogówki przeciwwskazane jest używanie soczewek kontaktowych. Jeśli używanie soczewek kontaktowych jest

konieczne, przed zakraplaniem należy je zdjąć. Ponownie można je założyć po co najmniej 15 minutach od wkroplenia preparatu. Jeśli jednocześnie z preparatem Ocusalin stosowane są inne krople do oczu należy skonsultować się z lekarzem okulistą. Należy zachować odstęp co najmniej 5 minut pomiędzy zakraplaniem kolejnych preparatów.

Po zastosowaniu preparatu może wystąpić pieczenie i/lub podrażnienie oka, w którym zastosowano preparat.

Zawartość pojemnika przeznaczona jest do jednorazowego użytku. Preparat Ocusalin nie zawiera środków konserwujących. W związku, z czym jeśli w pojemniku pozostanie niewielka ilość roztworu należy go wyrzucić. Nie stosować preparatu po upływie daty ważności oznaczonej na każdym pojemniku.

Skład:

Chlorek sodu, woda do wstrzyknięć

Opakowanie:

20 minimsów po 0,5 ml

Przechowywanie:

Preparat należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.

Należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.