

# Orofar aerozol 30 ml



Cena: 26,62 PLN

## Opis słownikowy

|                   |  |
|-------------------|--|
| Dawka             | (2mg+1,5mg)/ml                                 |
| Opakowanie        | 30 ml  |
| Postać            | aer.do st.w j.ustnej                           |
| Producent         | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH                  |
| Substancja czynna | Benzoxonium chloride, Lidocainum hydrochloride |

## Opis produktu

### Orofar, (2 mg + 1,5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej

Aerozol z dozownikiem

Precyzyjnie i szybko dociera w źródło bólu  
Uśmierza ból i eliminuje infekcję gardła  
Stosowany w bólu gardła towarzyszącemu przeziębieniu, zapaleniu gardła i zapaleniu krtani

#### Skład:

Orofar Aerozol zawiera substancję o działaniu antyseptycznym - benzoksoniowy chlorek (2 mg) oraz miejscowo działający składnik znieczulający - chlorowodrek lidokainy (1,5 mg).

#### Stosowanie:

Orofar Aerozol należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat: Nie należy stosować leku Orofar Aerozol u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: Zalecana dawka to 2-3 rozpylenia aerozolu na tylną ścianę gardła w miejscu bólu. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć 3 do 6 razy na dobę z zachowaniem 2-3 godzinnych odstępów czasowych między kolejnymi aplikacjami.

U dzieci lek należy stosować pod kontrolą osoby dorosłej. Nie należy stosować u dzieci, które w czasie podawania leku nie potrafią wstrzymać oddechu.

Dorośli: Zalecana dawka to 4 rozpylenia aerozolu na tylną ścianę gardła w miejscu bólu. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć 3 do 6 razy na dobę z zachowaniem 2-3 godzinnych odstępów czasowych między kolejnymi aplikacjami.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

#### Sposób podawania:

zdejść z pojemnika zatyczkę ochronną,  
lekko dociskając nałożyć na pojemnik końcówkę dozownika,

przed pierwszym użyciem kilka razy nacisnąć pompkę w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia, trzymając pojemnik z dala od twarzy należy naciskać pompkę do momentu rozpylenia jednej dawki leku w powietrze, trzymając pojemnik pionowo rozpylić roztwór w jamie ustnej lub na tylną ścianę gardła. Należy wstrzymać oddech w trakcie rozpylania, po każdorazowym użyciu końcówka dozownika powinna być oczyszczona i wysuszona, po zastosowaniu preparatu zdjąć końcówkę dozownika i przechowywać ją razem z preparatem w opakowaniu zewnętrznym, aby uniknąć rozprzestrzenienia się zakażenia końcówka dozownika powinna być stosowana tylko przez jedną osobę, nie należy stosować leku gdy końcówka dozownika jest uszkodzona.

**Ostrzeżenia:**

Nie stosować leku Orofar Aerosol jeśli pacjent ma uczulenie na benzoksoniowy chlorek lub inne czwartorzędowe sole amoniowe którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lidokainy chlorowodorek lub inne miejscowo znieczulające leki amidowe. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Orofar Aerosol gdy: bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka lub występują poważne trudności z przełykaniem, objawy nie ulegają poprawie lub utrzymują się przez dłużej niż 3 dni. Leku nie należy rozpylać w pobliżu oczu ani wdychać (należy wstrzymać oddech przy rozpylaniu). Podczas stosowania leku Orofar Aerosol należy zachować ostrożność w przypadku występowania ran lub zmian w jamie ustnej i błonie śluzowej gardła. Leku Orofar Aerosol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

**Działania niepożądane:**

Jak każdy lek, Orofar Aerosol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy zaprzestać stosowania leku Orofar i niezwłocznie zwrócić się po pomoc lekarską w przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych, które mogą być objawem reakcji alergicznej: trudności w oddychaniu lub przełykaniu, opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła, silny świąd skóry z czerwoną wysypką i pęcherzami. Te działania niepożądane są bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób). Niektóre objawy niepożądane występują często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): podrażnienie lub mrowienie w jamie ustnej lub gardle.

**Dostępne opakowania:**

Butelka o pojemności 30 ml